

*Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Медицинский колледж города Жезказган*



Алимбетова Л.А.

*Классификация лекарственных средств по
группам фармакологического действия.*

Учебное пособие по основам фармакологии

Жезказган 2014

Рецензенты: 1. Молдина М.А -преподаватель терапии
медицинского колледжа города Жезказган, преподаватель
высшей категории.

2.Коканова Т.А. –преподаватель фармакологии
медицинского колледжа города Жезказган, преподаватель
первой категории

Автор пособия:Алимбетова Л.А.-преподаватель
фармакологии медицинского колледжа города Жезказган,
преподаватель высшей категории.

Настоящее справочное пособие составлено в соответствии
с требованиями Государственного образовательного стандарта
по специальности «Медсестра», «Фельдшер», «Акушер»,
«Стоматолог»

Адресовано студентам медицинского колледжа для
совершенствования и систематизации знаний по основам
фармакологии.

Справочное пособие рассмотрено на заседании цикловой
методической комиссии общепрофессиональных дисциплин
12. 12. 2013г. Протокол №4

Медицинский колледж города Жезказган

Содержание

Страница

| | |
|---|----|
| 1. Пояснительная записка..... | 2 |
| 2. Список сокращений в тексте | 3 |
| 3. Дозирование лекарств | 3 |
| 4. Лекарственные средства, влияющие на периферическую афферентную нервную систему..... | 4 |
| 5. Лекарственные средства, влияющие на эфферентную нервную систему | 7 |
| 6. Лекарственные средства, влияющие на центральную нервную систему..... | 13 |
| 7. Лекарственные средства, влияющие на функции органов дыхания..... | 22 |
| 8. Лекарственные средства, влияющие на сердечно- сосудистую систему | 26 |
| 9. Лекарственные средства, влияющие на функцию органов пищеварения | 35 |
| 10. Лекарственные средства, влияющие на систему крови. | 42 |
| 11. Лекарственные средства, влияющие на миометрий..... | 48 |
| 12. Препараты гормонов..... | 49 |
| 13. Витаминные препараты | 53 |
| 14. Противоаллергические средства | 55 |
| 15. Противомикробные средства. Антисептические и дезинфицирующие средства..... | 57 |
| 16. Химиотерапевтические средства. Антибиотики..... | 59 |
| 17. Синтетические противомикробные средства | 67 |
| 18. Противотуберкулёзные средства..... | 68 |
| 19. Противовирусные средства..... | 69 |
| 20. Противопротозойные средства..... | 70 |
| 21. Противогрибковые средства..... | 70 |
| 22. Противоглистные средства..... | 71 |
| 23. Рентгеноконтрастные средства..... | 71 |
| 24. Лекарственные средства, применяемые при отравлениях медикаментами..... | 72 |
| 25. Стандарты рецептов..... | 74 |
| 26. Рецептурный бланк формы № 1 | 75 |
| 27. Рецептурные сокращения..... | 77 |
| 28. Список литературы..... | 79 |
| 29. Латинский алфавит..... | 80 |

Пояснительная записка

Фармакология самый труднодоступный, объёмный, латинизированный предмет в медицине, студентам самостоятельно тяжело ориентироваться в потоке огромной фармацевтической информации и алгоритмизировать несовершенные знания при изучении лекарственных средств.

Настоящее пособие по основам фармакологии составлено в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта для систематизации знаний студентов по предмету; развития фармакологического, клинического, логического, ассоциативного мышления; для применения этой учебной информации при выполнении самостоятельной работы на теоретических и практических занятиях и при подготовке в домашних условиях к предмету, включая предметы клинического цикла.

Лекарственные средства обобщены в группы по фармакологическому действию и назначению; представлены международные непатентованные, официальные и патентованные названия лекарственных веществ, их синонимы и аналоги, названия лекарственных растений. Лекарственных веществ, средств и препаратов в пособии 1150 единиц, указаны их дозировки, способы назначения и применения; даны классы, группы и подгруппы лекарственных средств по фармакологическому действию.

Для осуществления межпредметных и внутривидовых связей в процессе обучения основам фармакологии в пособие включены: латинский алфавит, дозирование лекарств, стандарты наиболее часто выписываемых рецептов, рецептурные сокращения, рецептурный бланк формы №1, указаны источники фармацевтической информации.

Пособие предназначено для специальностей: «Медсестра», «Фельдшер», «Акушер», «Стоматолог», «Лаборант».

Список сокращений

| | |
|--|-------------------|
| А/Д – артериальное давление | а- альфа |
| β- бетта | Амп- ампула |
| ч.ложка- чайная ложка | Р-р -раствор |
| Гл.кап- глазные капли | Пор- порошок |
| Таб в обол –таблетки в оболочке | Таб- таблетки |
| Капс- капсулы | Св- свечи |
| Фл, Флак- флаконы | мл- миллилитр |
| ЕД-единицы действия | мг-милиграмм |
| МЕ – международные единицы | п/к- подкожно |
| г, гр- грамм | в/в- внутривенно |
| в/м -внутримышечно | д/и- для инъекций |
| д/ингал.-для ингаляций | млн- миллион |
| д/внутр- для внутреннего применения | |
| «Андипал»- официальные таблетки (в кавычках) | |
| арт. гипертензии- артериальные гипертензии | |
| при восп. заб-х- при воспалительных заболеваниях | |
| б-ни ЖКТ- болезни желудочно-кишечного тракта | |
| б-ни к-ка- болезни кишечника | |
| б-ни 12п к-ки- болезни двенадцатиперстной кишки | |
| язв. б-нь ж-ка- язвенная болезнь желудка | |

Дозирование лекарств

| |
|---|
| 1,0- 1 грамм или 1000 милиграмм (мг) |
| 0,1- 1 дециграмм или 100 мг |
| 0,01- 1 сантиграмм или 10 мг |
| 0,001- 1 милиграмм или 1000 микрограмм (мкг) |
| 0,0001- 1 децимилиграмм или 100 микрограмм (мкг) |
| 0,00001- 1 сантимилиграмм или 10 микрограмм (мкг) |
| 0,000001- 1 милимилиграмм или 1 микрограмм |
| 1 литр=1000 миллилитров (мл) |
| 1 столовая ложка = 15 мл |
| 1 десертная ложка = 10 мл |
| 1 чайная ложка = 5 мл |
| в 1 мл воды или водного раствора-20 капель |
| в 1 мл спирта или спиртового раствора-60 капель |

Лекарственные средства, влияющие на нервную систему.

I. Лекарственные средства, влияющие на периферическую нервную систему.

Средства, действующие преимущественно в области чувствительных (афферентных) нервных окончаний.

1. Средства, понижающие чувствительность нервных окончаний

А) Местноанестезирующие препараты

| № | Название лекарства | Форма выпуска | Применение |
|---|--|--|--|
| 1 | Новокаин Novocainum (Прокаин Этокаин Procaine Атоксикаин) | 0,25%,0,5%,1% 2% р-р в амп. 1,2,5мл, фл, порошок, свечи 0,1г | Для местной, инфильтрационной, проводниковой анестезий, для разведения некоторых антибиотиков. |
| 2 | Дикаин Dicainum (Феликаин Пантокаин) | Пор, р-ры гот. Ex tempore | Для местной анестезии 0,25% 1%, 2% |
| 3 | Анестезин Anaesthesinum (Бензокаин Норкаин) | Порошок, Таблетки 0,3г, св.«Anusolum» | В составе мазей, суппозиториев и суспензий для местных анестезий. |
| 4 | Лидокаин Lidocainum (Ксикаин) | 1%,2%,10% р-р в амп 1,2,5мл, фл., гель, аэрозоль 10% | Для местной, терминальной анестезии и при аритмиях. |
| 5 | Инкаин Incainum (Беноксинат Венохунат) | Пор. для приг. 0,4% р-ра | Для анестезии глаз. |
| 6 | Бупивакаин (Анекаин) Bupivacaine | Амп 0,25%, 0,5% - 1мл | Для инфильтрационных анестезий. |
| 7 | Тримекаин Trimescainum (Мездикаин Мезокаин) | Амп 0,25%, 0,5%, 1%, 2%, 5% -1мл, 2мл | Для инфильтрационных анестезий. |

Б). Вяжущие средства

| № | Название лекарства | Форма выпуска | Применение |
|---|---|--------------------------------|---|
| 1 | Танин Tanninum | Порошок для приг. 4% р-ра | Для промывания ЖКТ. |
| 2 | Кора дуба Cortex Quercus | Измельчённое сырьё в пачках | Отвар 1:10 для полосканий, орошений, внутрь. |
| 3 | Шалфея листья Folia Salviae officinalis | Измельчённое сырьё 100г | Противовоспалительное для полосканий. |
| 4 | Цветы ромашки Flores Chamomillae recutitae | Измельчённое сырьё 50г | Внутрь при заболеваниях ЖКТ, наружно для полосканий и примочек. |
| 5 | Трава зверобоя Herba Hyperici | Трава в пачках по 50г | Наружно для полосканий и внутри при поносах, колит. |

| | | | |
|---|---|-------------------------|---|
| 6 | Трава череды Herba Bidentis | Трава в упаковке 50г | Как мочегонное, потогонное и при диатезе. |
| 7 | Ротокан Rotocanum (смесь жидких экстрактов ромашки календулы, тысячелистника) | Флаконы по 25 и 50мл | Как противовоспалительное для обработки слизист. 1ч.ложка на стакан воды. |
| 8 | Плоды черники Fructus Myrtilli | Плоды в упаковке 50г | В виде настоя и отвара как вяжущее. |

С). Обволакивающие средства

| № | Название лекарства | Форма выпуска | Применение |
|---|----------------------------|---|---|
| 1 | Крахмал Amylum | Порошок для приготовления присыпок. | В виде слизи внутрь для замедленного всасывания лек.ср-в, для клизм. Входит в состав присыпок и пудр. |
| 2 | Семена льна Semina Lini | Семена в упаковке 50г | В виде слизи как обволакивающее и смягчающее. |

Д). Соли металлов обладающие адсорбирующим, обволакивающим, антацидным и гастропротекторным действием

| № | Название лекарства | Форма выпуска | Применение |
|----|--|---|---|
| 1 | Алмагель Almagel | Фл.170мл суспензия | При язв.б-ни ЖКТ и гиперацидном гастрите. |
| 2 | Маалокс «Maalox» Магальдрат | Таб., сусп.250мл во фл. и пакетах | При язв.б-ни ЖКТ и гиперацидном гастрите. |
| 3 | Гастал «Gastal» | Таблетки | При язв.б-ни ЖКТ и гиперацидном гастрите. |
| 4 | Протаб «Protab» | Таблетки | При язв.б-ни ЖКТ и гиперацидном гастрите. |
| 5 | Висмута нитрат основной Bismuthi subnitratis | Вх, в состав таб. «Викалин», «Викаир», Де-нол | При язвенной болезни желудка и 12перстной кишки, гиперацид. гастрите. |
| 6 | Викалин «Vicalinum» | Таблетки | При язв. б-ни органов ЖКТ и гиперацидном гастрите. |
| 7 | Викаир «Vicaicum» | Таблетки | При язв. б-ни органов ЖКТ и гиперацидном гастрите. |
| 8 | Диосмектит (Смекта) Diosmektit | Порошок для суспензий | При диарее, воспалительных заболеваниях ЖКТ. |
| 9 | «Де-Нол» «De-Nol» | Таблетки | При язв. б-ни органов ЖКТ и гиперацидном гастрите. |
| 10 | Ксероформ Xeroformium | Пор. в составе мазей, присыпок | Воспалительные заболевания кожи. |
| 11 | Дерматол Dermatolum | Пор. в составе мазей, присыпок | Заболевания кожи воспалительного характера. |
| 12 | «Ренни» «Renni» | Таблетки | При язв. болезни ЖКТ и гиперацидном гастрите. |

Е) Адсорбирующие

| № | Название лекарства | Форма выпуска | Применение |
|---|--------------------|---------------|------------|
|---|--------------------|---------------|------------|

| | | | |
|---|---|---------------------------|--|
| 1 | Уголь активированный Carbo activatus | Таб. 0,25 и 0,5г, порошок | При отравлениях 25г как универсальный антидот, при метеоризме. |
| 2 | Глина белая Bolus alba | Порошок | При отравлениях, присыпка. |
| 3 | Каолин Caolinum | Порошок | При отравлениях, присыпка. |
| 4 | Шунгит | Камни, пор. | Наружно при воспален. |

2. Средства, стимулирующие рецепторы слизистых оболочек кожи и подкожной клетчатки А) Раздражающие ЛС

| № | Название лекарства | Форма выпуска | Применение |
|---|---|--|---|
| 1 | Аммиака раствор (Нашатырный спирт) Solutio Ammonii caustici | Амп.10% - 1мл, фл10%-25мл | При потере сознания и в качестве антисептика. |
| 2 | Валидол Validolum | Таб. 0,06г, кап - сулы, флак.10мл | Как лёгкий спазмолитик при стенокардии, под язык. |
| 3 | Ментол Mentholum | Порошок в составе комбинированных р-ров и мазь | При артритах, миалгиях. |
| 4 | Этиловый спирт Spiritus aethylicus | 70%,90%,95% растворы | Для дезинфекции, обработки 70 %; 40% и 20% для компрессов. |
| 5 | Горчичники Charta Sinapis | Бумага, покрытая семенами горчицы | При воспалении суставов, верхних дыхательных путей, миозитах. |
| 6 | Скипидар (Терпентинное масло очищенное) Oleum Terebinthinae rectificatum) | Мазь во флаконах по 50гр | При воспалении суставов, верхних дыхательных путей, миозитах. |
| 7 | Плантаглюцид Plantagluglucidum | Гранулы во фл. по 50г | При гипоацидном гастрите, язвенной болезни с пониженной кислотностью. |

Б) Отхаркивающие

| № | Название лекарства | Форма выпуска | Применение |
|---|--|--|---|
| 1 | Термопсис Thermopsis (Мышатник) | Пор, таблетки «Codthermops», «Codtherpin» | Отхаркивающее и рвотное, официальные таблетки от кашля. |
| 2 | Натрия гидрокарбонат Natrii hydrocarbonas | Порошок для приготовления 4% стерильного р-ра для инфузий и 4%-ингаляций | Отхаркивающее, для нейтрализации кислот при ацидозе и кетоацидозах. |
| 3 | Калия йодид | Пор для приготовл. | Воспалит. заб-я верхних |

| | | | |
|---|---------------------|--|--|
| | Kalii iodidum | 3% раствора | дыхательных путей, глаз. |
| 4 | Камфора Camphora | Пор внутрь 0,1г; Solutio Camphorae spirituosa et oleosa 20% маслян. и 10% спирт. р-ры, мазь. | Отхаркивающее и местно при артрите, ревматизме, пролежнях. |
| 5 | Ментол Mentholum | Порошок, спирт.р-р вход. в состав: Боро- ментола, Меновазина, Гевкамена, Эвкамона, Таб. «Пектуссин» и сердечных микстур | Как успокаив.при стено - кардии. Интраназально при восп.заб-х верхних дыхательных путей. Ввиде растираний при невралгии, артралгии. |

С) Слабительные

| № | Название лекарства | Форма выпуска | Применение |
|---|-----------------------------------|---------------|--|
| 1 | Магния сульфат Magnesii sulfas | Порошок | Внутрь при запорах по 20,0-25,0г |
| 2 | Натрия сульфат Natrii sulfas | Порошок | При отравлениях 20,0-25,0г в 0,5 стакана воды. |

Д) Рвотные

| № | Название лекарства | Форма выпуска | Применение |
|---|--|----------------------|---|
| 1 | Апоморфина гидрохлорид Aromorphini hydrochloridum | Амп 1% -1мл | В качестве рвотного при необходимости быстрого удаления из желудка токсических и других в-в подкожно 0,2-0,3мл. |
| 2 | Цинка сульфат Zinci sulfas | Драже, таб по 3-10мг | Внутрь как рвотное. |

Е) Горечи

| № | Название лекарства | Форма выпуска | Применение |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | Польнь Absinthium | Трава 50г, настойка 25мл | Для возбуждения аппетита. |
| 2 | Лук Allium sera | В упаковке | Для возбуждения аппетита. |
| 3 | Чеснок посевной Allium sativum | В упаковке | Для возбуждения аппетита. |
| 4 | Перец красный Capsicum | Настойка фл 50мл | При отсутствии аппетита во время длительных инфекционных заболеваний. |

Лекарственные средства, влияющие на эфферентную (двигательную) иннервацию

Классификация: 1.Холинергические средства

2.Адренергические средства

3.Дофаминергические средства

- Холинергические средства:** а) М-холиномиметики
 б) Н-холиномиметики
 в) М- и Н- холиномиметики
 д) Антихолинэстеразные средства
 е) М-холиноблокаторы
 ф) Н-холиноблокаторы
 г) М- и Н-холиноблокаторы

а) М-холиномиметики

| № | Название лекарства | Форма выпуска | Применение |
|---|---|---------------------------------|--|
| 1 | Пилокарпина гидрохлорид Pilocarpini hydrochloridum | Фл 1%, 2%, 4% р-р по 10мл | При глаукоме в виде глазных капель. |
| 2 | Ацеклидин Aceclidinum | Амп 0,2%-1мл, порошок | При глаукоме, атонии кишечника, мочевого пузыря и матки. |

б) Н-холиномиметики

| | | | |
|---|--|---------------------------------|---|
| 1 | Цититон Cytitonum (Цитизин, «Табекс») | Амп 1мл, таб 0,0015г | Для стимуляции дыхания. Для облегчения отвыкания от курения. |
| 2 | Лобелина гидрохлорид Lobelini hydrochloridum «Лобесил» | Амп 1%- 1мл и таб 0,002г | Для стимуляции дыхания и таблетки при отвыкании от курения. |
| 3 | Никотин («Никоретте», Никотинелл ТТС)- Nicotinum | Жев. ре- зинки по 2 и 4мг | Для облегчения отвыкания от курения. |

в) М-и Н-холиномиметики

| | | | |
|---|--|--|---|
| 1 | Ацетилхолина хлорид Acetylcholini chloridum | Амп по 0,1 и 0,2г, разводят водой д/и | При спазмах периферич. сосудов, артерий сетчатки, атонии кишечника и мочевого пузыря. |
|---|--|--|---|

д) Антихолинэстеразные средства

| | | | |
|---|--|--|--|
| 1 | Прозерин Proserinum | Амп 0,05%-1мл таб 0,015г, гранулы | При миастении, параличах, атрофии зрительного нерва, невритах, атонии кишечника и мочевого пузыря. |
| 2 | Физостигмина салицилат Physostigmini salicylas | Порошок, г/л капли 0,25% и 1% | Для снижения внутриглазного давления. При миастениях. |
| 3 | Галантамина гидробромид Galanthamini hydrobromidum | Амп 0,1% 0,5%, 1% -1мл | При миастении, мышечной дистрофии, невритах, атонии кишечника и мочевого пузыря. |

е) М-холиноблокаторы

| | | | |
|---|-------------------------------------|------------------|--|
| 1 | Атропина сульфат Atropini sulfas | Амп 0,05%-1мл | При язв. б-ни ЖКТ, пилороспазме, холецистите, желчнокам. |
|---|-------------------------------------|------------------|--|

| | | | |
|-----------------------------|---|--|--|
| | | 0,1%-1мл, глазные капли 1%-10мл; таб 0,005г. | б-ни, спазмах к-ка и мочевых путей, бронхоспастических состояниях, синусовой бра - дикардии. В анестезиологии перед наркозом и во время операции для предупреждения бронхо- и ларингоспазма, ограничения секреции слюнных и бронх. желёз. В глазной диатнике для расширения зрачка и для расслабления мышц глаза при травмах и восп.глаз |
| 2 | Платифиллина гидротартрат Platyphyllini hydrotartras | Амп 0.02%-1мл таб 0,005г, св. 10мг. | При спазмах гладких мышц органов брюшной полости, бронхов, кровеносных сосудов, брадиаритмиях. |
| 3 | Скополамина гидробромид Scopolamini hydrobromidum | Амп 0,05%-1мл | Как атропин. Оказывает успокаив. противорвотное действие.Применяется для лечения паркинсонизма. |
| ф) Н-холиноблокаторы | | | |
| Ганглиоблокаторы | | | |
| 1 | Бензогексоний Benzoehexonium | Амп 2,5% -1мл, таб 0,1 и 0,25г | Для леч А/Г, при спазмах перифер. сосудов, язв б-ни ж-ка и 12п к-ки, бронхоспазмах. |
| 2 | Пентамин Pentaminum | Амп 5%-1мл 5%-2мл | Для леч А/Г, при спазмах перифер. сосудов, язв б-ни ж-ка и 12п к-ки, бронхоспазмах. |
| 3 | Гигроний Hygronium | Пор 0,1г во фл | Для управляемой гипотензии. Р-ры готовят Ex tempore |
| 4 | Арфонад (Имехин) Arfonadum (Imechinum) | Амп 0,25г, 1% -1, 2мл | Для управляемой гипотензии, при отёках лёгких и гол мозга. |
| 5 | Пирилен Pirilenum | Таб 0,005г | Для леч А/Г, при спазмах перифер. сосудов, язв б-ни ж-ка и 12перстной кишки. |
| Миорелаксанты | | | |
| 1 | Ардуан Arduan (Пипекурония бромид) | Порошок по 0,004г +2мл изотонич р-ра | При интубационном наркозе. |
| 2 | Тубокурарина хлорид Tubocurarine chloridum | Амп 1%-1, 5 мл | В анестезиологии для расслабления мышц. |
| 3 | Дитилин (Листенон) Dithylinum | Амп 2% -5мл | При интубационном наркозе. |

| | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|---|
| | g) М- и Н-холиноблокаторы | | |
| 1 | Циклодол Cyclodolum | Таб 0,001; 0,002; 5мг | При паркинсонизме, спастических параличах. |

Адренергические средства:

- а) Альфа- адреномиметики
- б) Бета- адреномиметики
- с) α -, β - адреномиметики
- д) Симпатомиметики
- е) α - адреноблокаторы
- ф) β - адреноблокаторы
- g) Симпатолитические средства
- h) Дофаминергические ЛС

| № | Название лекарства | Форма выпуска | Применение |
|---|---|---|---|
| | а) α-адреномиметики | | Сосудосуживающее при ринитах местно. |
| 1 | Мезатон (Фенилэфрин) Mesatonum | Амп 1% - 1мл , пор. | Для повышения А/Д при гипотонии. |
| 2 | Нафтизин Naphthysinum (Нафазолин, Санорин) | 0,05% и 0,1% кап- ли в нос и спрей | Для облегчения носового дыхания: вазомоторный ринит. |
| 3 | Клофелин (Гемитон, Клонидин) Clrophelinum | 0,125% и 0,25%-1мл, таб 0,000075; 0,00015 г. | Для купирования гипертонических кризов, хронической артериальной гипертензии. |
| 4 | Галазолин Galazolin (Ксилометазолин, Для нос, Ксимелин, Фармазолин) | 0,05% и 0,1% капли в нос и спрей по 10 мл | Для облегчения носового дыхания, риниты различной этиологии. |
| | б) β- адреномиметики | | При бронхиальной астме |
| 1 | Изадрин Isadrinum (Эуспиран Новодрин Солутан) | 0,5% и 1% р-р для ингаляций таб суб- лингвально 0,005г | При аритмии, бронхоспазм различной этиологии. |
| 2 | Фенотерол Fenoterol (Беротек, Партусистен Berotec) | Аэрозоль, порошок в капс и р-р во фл для ингаляций 300 доз | При бронхиальной астме и других бронхоспазмах. |

| | | | |
|--|---|---|---|
| 3 | Сальбутамол (Вентолин) Salbutamololum, Ventolin | 0,1%-2мл аэрозоль, порошок в капс и р-р д/инг; таб 2, 4мг; сироп 0,04%-100м | При приступах удушья и бронхиальной астме. |
| 4 | Орципреналин Orciprenalinum, (Астмопент Astmopent) | Аэрозоль, 0,05% р-р в амп; таб 0,02г | При приступах удушья и бронхиальной астме. |
| с) α- и β-адреномиметики | | | Для стимуляции сердечной деятельности, повышения А/Д. |
| 1 | Адреналина гидро- хлорид , г/т (Эпинефрин) Adrenalini hydrochlori- dum et hydrotartas | Амп 0,1% -1мл 0,18% -1мл д/и | При анафилактическом шоке, бронх. астме, аллергических реакциях, при передозировке инсулина. |
| 2 | Норадреналина гидро- тартрат (Норэпинефрин) Noradrenalini hydrotartras | Амп 0,2% -1мл | Для повышения А/Д в/в капельно в 5% р-ре глюкозы или 0,9% р-ре натрия хлорида. |
| д) Симпатомиметические средства | | | |
| 1 | Эфедрина гидрохлорид Ephedriini hydrochloridum | Пор, таб 0,01;0,025г 5%-1мл | Для повышения А/Д, при ринитах, бронх. астме. |
| 2 | «Теофедрин»(состав: теофиллин 0,1+кофеин 0,05+парацетамол 0,2+фенобарбитал0,02 +эфедрин 0,02+ экстр.красавки 0,003+ цитизин 0,0001г.)- «Theophedrinum» | Таблетки | Для лечения и профилактики бронхиальной астмы. |
| е) α-адреноблокаторы: | | | |
| 1 | Фентоламин Phentolaminum (Регитин) | Лиофили- зирова- нный пор 0,004г в амп, таб 5 и 10мг | При гипертонич.кризе, спазмах периферических сосудов, облитерирующем эндоартериите, трофических язвах нижних конечностей. |
| 2 | Тропафен Troparphenum | Лиофили- зирова- нный пор. по 0,02г+ вода д/и 2мл | При гипертонич.кризе, спазмах периферических сосудов, облитерирующем эндоартериите, трофических язвах нижних конечностей. |

| | | | |
|--|---|---|--|
| 3 | Празозин Prazosinum | Таб 0,0005; 0,001; 0,002; 0,005г. | При гипертонич.болезни, спазмах периферических сосудов, облитерирующем эндоартериите, трофических язвах нижних конечностей, аденоме предстательной железы. |
| ф) β- адреноблокаторы | | | |
| 1 | Анаприлин Anaprillinum (Обзидан, Пропранолол Obsidan) | Амп 0,25%,-1мл, таб 0,01 и 0,04г | Для леч ИБС, артер.гипертензии, тахиаритмий, для возбуждения и усиления род. деятельности, для сниж внутриглазного давления. |
| 2 | Тимолол Timololum (Арутимол, Окумед, Офтан , Тимоптик) | 0,1%;0,25%; 0,5% гл.капли, таб 5мг ; 0,01; 0,02г | При глаукоме для снижения глазного давления. |
| 3 | Атенолол (Атенолан) Atenololum | Таб 0,025; 0,05; 0,1г | Артериальные гипертензии, стенокардии, инфаркт миокарда, тахиаритмии. |
| 4 | Корвитол Korvitol (Метопролол, Эгилек Metoprolol, Egiloc) | Таб 0,025; 0,05; 0,1; амп 0,1%-5мл | Артериальные гипертензии, стенокардии, инфаркт миокарда, тахиаритмии. |
| 5 | Конкор (Бисопролол) Concor, Bisoprolol | Таб 0,005 и 0,01г. | Артериальные гипертензии, стенокардии, инфаркт миокарда |
| 6 | Корданум (Талинолол) Cordanum Небилет (Небиволол) Nebilet Бетоптик (Бетаксолол) Betoptic | Таб 0,05г, 0,005г 0,1; 0,02г гл капли 0,25% и 0,5%-5мл | Артериальные гипертензии, стенокардии и при глаукоме для снижения внутриглазного давления. |
| г) Симпатолитические средства (Гипотензивные) | | | |
| 1 | Резерпин Reserpinum | Таб 0,0001; 0,00025г. | Антигипертензивное, нейролептическое. |
| 2 | Октадин Octadinum | Таб 0,025г. | Антигипертензивное. |
| 3 | Метилдофа (Допегит) Methyldopa, (Dopegit) | Таб 0,25 и 0,5г. | Антигипертензивное. |
| 4 | Раунатин Raunatinum | Таб 0,002г. | Антигипертензивное, нейролептическое. |
| 5 | Физиотенз (Моксонидин) Physiotens, Moxonidin | Таб 0,2мг 0,0003 и 0,0004г. | Антигипертензивное. |

h) Дофаминергические средства:

| № | Название лекарства | Форма выпуска | Применение |
|---|---|---|--|
| 1 | Дофаминомиметики Дофамин Dophaminum (Допаминум) | Амп 0,5%-5мл; 2% и 4%- 5мл | При шоковых состояниях и для улучшения гемодинамики при острой СС и почечной недостаточности. |
| 2 | Леводопа (Диоксифенилаланин) Levodopa | Капс. 0,025г; таб 0,25; 0,5г. | При болезни Паркинсона и симптоматическом паркинсонизме. |
| 3 | Мидантан Midantanum | Таб 0,1г. | При паркинсонизме. |
| 4 | Наком Насом (Леводопа +Карбидопа) | Таб 0,05г. | При паркинсонизме. |
| 5 | Бромокриптин Bromocriptin | Таб 0,0025; 0,004; 0,01г | Для подавления послеродовой лактации и нормализации менстр. цикла, болезни Паркинсона, болезни Иценко-Кушинга. |
| 6 | Апоморфина г/х (смотри Раздражающие ЛС) | | |
| | Дофаминолитики | | |
| 1 | Метоклопрамид (Церукал Реглан) Metoclopramidum, Cerucal | Амп 0,5% -2мл, таб 0,005; 0,01г. | Противорвотное, успокаивающее тонус и двигательную активность желудка. |

II. Лекарственные средства, влияющие на ЦНС:

1. Средства для наркоза
2. Спирт этиловый
3. Снотворные средства
4. Противосудорожные средства (Противоэпилептические)
5. Противопаркинсонические средства
6. Анальгетики
7. Аналептики
8. Психотропные средства
9. Адаптогены

| № | Название лекарства | Форма выпуска | Применение |
|---|---|--------------------------------|---|
| | Средства для наркоза | | |
| 1 | Фторотан Phthorothanum | Жидкость во фл.50мл | Пары с закисью азота для наркоза перед операциями. |
| 2 | Эфир для наркоза Aether pro narcosi (огнеопасен, взрывоопасен) | Жидкость во фл. 100мл | Редко масочным или аппаратным способом для наркоза. |
| 3 | Азота закись Nitrogenii peroxudum | Металл. баллоны по 10л | Для наркоза в смеси с кислородом баллоны под давлением 50 атмосфер. |
| 4 | Гексенал Hexenalum | Пор 1,0 для инъекционных р-ров | Снотворное и наркотическое 1-2% р-р в/в по 1-2мл. |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|---|
| 5 | Кетамина гидрохлорид (Калипсол) Ketamini hydrochloridum, Kalipsol | 1% и 5%- 5мл, 10мл в амп и фл. | Наркотизирующее и анальгетическое в/в капельно или в/м. |
| 6 | Тиопентал натрия Thiopentalum Natrii в сочетании с барбитуратами | Порошок 0,5 и 1,0 для приг. инъекц. растворов Ex tempore | Снотворное и наркозирующее 2,5% р-р в/в 1-3мл. |
| 7 | Пропофол Propofol | 1% водно- эмульсион- ный р-р 20- 50-100мл | Для вводного наркоза и под- держания общей анестезии в/в капельно. Не используется в акушер- ской практике. |
| 8 | Спирт этиловый Spiritus aethylicus | 40%, 70%, 90%, 95% р-ры по 50мл | Как протившоковое, болеутоляющее. |
| Снотворные средства | | | |
| 1 | Фенобарбитал (Люминал) Phenobarbitalum (Luminal) | Порошок, таб 0,005; 0,05 ;0,1г. «Pentalgi- num» «Andipalum» | Снотворное, противоэпилептическое, успокаивающее, спазмолитическое. Вх. в состав препаратов: «Пентальгин», «Андипал», «Геофедрин», Корвалол, Валокордин, Барбовал. |
| 2 | Нитразепам (Радедорм) Nitrazepamum Radedorm | Таб 0,005 и 0,01г. | При нарушениях процесса сна, противосудорожное, успокаивающее. |
| 3 | Бромизовал Bromisovalum | Таб 0,3г. | Снотворное, успокаивающее. |
| 4 | Зопиклон (Имован Сомнол) Zopiclon, Imovan | Таб 0,005; 0,01г. | Снотворное. |
| 5 | Донормил Donormil (Доксиламин Doxylamin) | Таб 0,015г. | Снотворно-седативное. |
| 6 | Натрия оксибутират Natrii oxybutyras | Амп 20%-10мл | Для наркоза, при невротических состояниях. |
| Противосудорожные средства | | | |
| 1 | Диазепам Diazepam (Сибазон, Реланиум, Седуксен, Брюзепам, Sibazonum, Relanium, Seduxen) | Амп 0,5%-2мл, таб 0,005г | При неврозах, психопатиях, шизофрении, депрессии, судорогах, эпилепсии, зудящих дерматозах. |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 2 | Фенобарбитал (Люминал) Phenobarbitalum, (Luminal) | Порошок, таб 0,005; 0,05; 0,1г. | Снотворное, противозеп- лептическое, успокаивающее, спазмолитическое. Вх в сос тав препаратов: «Пенталь- гин», «Андипал», «Теофед- рин», Корвалол, Валокордин, «Барбовал». |
| 3 | Бензонал Benzonalum | Таб по 0,05; 0,1г. | Снотворное, противозеп- лептическое, успокаивающее, спазмолитическое. |
| 4 | Хлоралгидрат Chloralum hydratum | Пор внутрь по 0,2-0,5г или 2% р-р для клизм с обволакиваю- щими в-вами. | Противосудорожное, для премедикации. |
| 5 | Конвулекс (Ацедипрол, Депакин, Энкорат, Вальпроат натрия, Конвульсофин) Convulex, Acediprolum, Depacin, Encorat, Valproat sodium | Таб 0,3г, капс, драже, лиофил.по- рошок д/и Ex tempore | Противоэпилептическое, противосудорожное. |
| 6 | Финлепсин (Карбамазепин, Зептол) Carbamazepin, Finlepsin, Zeptol | Таб 0,2г | Противоэпилептическое, противосудорожное. |
| 7 | Магния сульфат Magnesii sulfas | Амп 25%- 5мл и 10мл | Противосудорожное, спазмолитическое. |
| 8 | Дифенин Dipheninum | Таб 0,117г №10 | При аритмии, эпилепсии. |
| Антиспастические препараты (уменьшающие спастичность и судорожные реакции) | | | |
| 1 | Мидокалм (Толперизон) «Mydocalm» | Таб, 0,05г драже 0,05г., амп.10%-1мл | При болезненных мышечных спазмах, болях, судорогах. |
| 2 | Сирдалуд (Тизанидин) «Sirdalud», Tizanidine | Таб по 2, 4, 6мг | При болезненных мышечных спазмах, болях, судорогах. |
| 3 | Баклофен (Лиорезал) «Baclofen» Lioresal | Таб по 10мг и 25мг | При спастичности. Противо- показано при паркинсонизме. |
| Противопаркинсонические средства | | | |
| 1 | Леводopa Levodopa | Капс и таб по 0,25; 0,5г | При болезни Паркинсона, паркинсонизме. |

| | | | |
|----------------------------|---|---|--|
| 2 | Мидантан Midantanum (Амантадин, Вирегит) | Таб по 0,1г. | При болезни Паркинсона, паркинсонизме. |
| 3 | Циклодол Cyclodolum | Таб по 0,001 0,002;0,005г | При болезни Паркинсона, паркинсонизме. |
| 4 | Мидокалм Mydocalm (Толперизон) | Амп 10%- 5мл, таб по 0,05; 0,15г. | При паркинсонизме, параличах, парампарезах. |
| 5 | «Наком» «Насом» (Леводопа+ Карбидопа) | Таб | При болезни Паркинсона и паркинсонизме. |
| Анальгетики | | | |
| Наркотические: | | | |
| 1 | Морфина гидрохлорид (Долтард) Morphini hydrochloridum | Амп 1%-1мл , таб 0,01г. | При сильных болях, сильном кашле, сильной одышке с сердечной недостаточностью. |
| 2 | Промедол (Тримепердин) Promedolum | Амп 1% и 2%-1мл, таб по 0,025г. | При сильных болях, для профилактики болевого шока, сильном кашле. |
| 3 | Оmnopон Omponum | Амп.1% и 2%-1мл | При сильных болях, сильном кашле, сильной одышке с сердечной недостаточностью. |
| 4 | Кодеина фосфат Codeini phosphas | Таб по 0,015г. | При сильных болях и для успокоения кашля. |
| 5 | Фентанил Phentanium | Амп 0,005% - 1мл используется только в стационаре. | Для нейролептанальгезии, для снятия острых болей при инфаркте миокарда, стенокардии, почечной и печёночной колике. |
| 6 | Буторфанол Butorphanol | 0,2%-1мл; 1% интра- назальный аэрозоль | При сильных болях, для премедикации. |
| 7 | Трамадол (Трамал) Tramadolum | Амп 5%, 10%-1мл; таб по 0,1; 0,15; 0,2г, свечи 0,1г, капс 0,05г. | При сильных болях, для премедикации, при невралгиях. |
| 8 | Пентазоцин Pentazocine | Амп 3%-1мл | Нетерпимые боли. |
| Антагонисты опиатов | | | |
| 1 | Налоксон Naloxon | Амп 0,04%-1мл для в/м и в/в инъекций | При острой интоксикации наркотическими анальгетиками, при алкогольной коме, для диагностики наркоманий. |

| | | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| 2 | Налорфина гидрохлорид Nalorphini hydrochloridum | 0,5% -1мл для взрослых и 0,05%-1мл для детей в/в и в/м инъекц | При острой интоксикации наркотическими анальгети- ками, при алкогольной коме, для диагностики наркоманий. |
| Ненаркотические анальгетики | | | |
| 1 | Кеторол (Кетанов Кеторолак) Ketorol Ketanov Keterolac | Амп 3%-1мл; таб по 0,01г. | Боли головные, зубные, мышечные, суставные, невралгические, органичные. |
| 2 | Кетонал Ketonal (Кетопрофен, Фастум Ketoprofen Fastum) | Амп 5%-2мл; таб 0,2, капс, свечи 0.1, спрей, гель, пор д/и | Анальгетическое, противовоспалительное, жаропонижающее. |
| 3 | Ацетилсалициловая кислота (ТромбоАСС, Упсарин, Аспирин Кардио, Кардиомагнил, Алка-Зельтцер) Acidum acetylsalicylicum, TromboASS, Aspirin, Cardiomagnil | Таб по 0,1; 0,25; 0,5г. «Цитрамон П», «Аскофен П» | Анальгетическое, противовоспалительное, жаропонижающее, тромборазжижающее. |
| 4 | Парацетамол (Панадол, Тайленол, Цефекон Д, Эффералган, Калпол) Paracetamolum, Panadol, Efferalgan | Р-р, сироп, суспензия, для приёма внутри, свечи, таб, капс. 0,2г | Болеутоляющее, жаропонижающее. Вх. в состав препаратов: Колдрекс, Солпадеин, Ринзасип, Гриппостад, Тера-Флю. |
| 5 | Натрия салицилат Natrii salicylas | Амп 10%- 5мл в/в, таб по 0,25 и 0,5г. | Анальгетическое, противовоспалительное, жаропонижающее. |
| 6 | Анальгин (Метамизол натрия, Баралгин-М) Analginum | Амп 25%-2мл, 50%-1 мл, таб по 0,5; 0,1; 0,05г. | Анальгетическое, противо- воспалительное, жаропо- нижающее. Вх в состав таб «Андипал», «Темпальгин», «Пентальгин», «Седалгин». |
| 7 | Баралгин Baralgin (Брал, Максиган, Спазган, Спазмалгон, Триган «Spasmalgon») | Амп по 5мл д/и и таб | Как анальгетик, антиспасти- ческое, спазмолитическое «Spasmalgon» Комбинир. препарат содерж: 0,5анальги на; 0,005 питофенона (холиноблокатор) 0,0001г фенпивериния бромид (ганглиоблокатор). |

| | | | |
|-------------------|---|--|---|
| 8 | Бутадион Butadionum | Таб по 0,03 0,05 и 0,15г., мазь 5%-20г | Анальгетическое, противовоспалительное, жаропонижающее. Вх в состав препаратов Реопирин, Амбене, Пирабутол. |
| 9 | Ибупрофен Ibufrofenum (Бруфен, Долгит, Нурофен, Ибуклин Новаган Brufen, Dolgit, Nurofen) | Таб 0,2г, капс, драже, крем, гель5%-30,0, р-р для приё- ма внутрь | Анальгетическое, противовоспалительное, жаропонижающее. Вх. в состав таб. Ибуклин, Новиган. |
| 10 | Индометацин (Метиндол) Indometacinum | Амп 3%-5мл, таб 0,025г, капс, гель, мазь, свечи | Анальгетическое, противовоспалительное, жаропонижающее. Входит в состав геля Индовазин. |
| 11 | Диклофенак натрия Diclofenac-natrii (Вольтарен, Ортофен, Диклоген, Блесин) Ortofenum, Voltaren) | Амп2,5%-3мл мазь2%-10г, таб 0,025г, свечи 15мг | Анальгетическое, противовоспалительное, жаропонижающее. |
| 12 | Ксефокам (Лорноксикам) Xefocam, (Lornoxicam) | Лиофилизир. пор. д/и по 0,008г. Ех tempore таб 0,004; 0,008г. | Анальгетическое, противовоспалительное, жаропонижающее. |
| 13 | Найз Nize (Нимесулид, Нимесил Nimesulide) | Таб 0,1и 0,2г, 1% суспензия для приёма внутри, гель | При остеоартритах, ревматоидном артрите, бурситах, при болях, лихорадке. |
| Аналептики | | | |
| 1 | Кофеин бензоат натрия Coffeinum- natrii benzoas | 10%-1мл амп, табл по 0,075; 0,1; 0,2г. | Возбуждает дыхательный и сосудодвигательные центры. Примен. при мигрени, для повышения психической, фи- зической работоспособности. |
| 2 | Раствор камфоры масляный Solutio Camphorae oleosa | Амп20% -2мл масляный р/р для п/к введения | Стимулирует дыхательный и сосудодвигательный центры. Применяют при коллапсе, угнетении дыхания, отравлениях. |
| 3 | Кордиамин Cordiaminum (Диэтиламид никотино- вой кислоты 25% р-р) | Амп 2мл д/и; фл 25мл внутри по 20- 25кап. | При остром коллапсе и асфиксии, при шоковых состояниях, отравлениях. |
| 4 | Бемеград | 0,5%-1мл р-р | При угнетении дыхания и |

| | | | |
|---|--|---------------------------------|--|
| | Bemegridum | для в/в инъекций | кровообращения, при отравлениях. |
| 5 | Этимизол Aethimizolum | 1%, 1,5%-1мл таб по 0,1г | При угнетении дыхания и кровообращения, при отравлениях, при бронхиальной астме. |
| 6 | Цититон (Цитизин, Табекс) Cytitonum | Амп 1мл, плёнки, пластырь | Очень редко при угнетении дыхания и кровообращения, при отравлениях. |
| 7 | Лобелина гидрохлорид Lobelinei hydrochloridum | Амп 1%-1мл | Очень редко при угнетении дыхания и кровообращения, при отравлениях. |

Психотропные средства делятся на:

1. Нейролептики
2. Транквилизаторы
3. Седативные средства
4. Препараты лития
5. Антидепрессанты
6. Психостимуляторы
7. Ноотропные средства

| № | Название лекарства | Форма выпуска | Применение |
|---|---|--|--|
| Нейролептики, ЛС угнетающего типа действия | | | |
| 1 | Аминазин Aminazinum | Амп 2,5%-2мл таб 0,025г, драже 0,025г | При психозах, эпилепсии, тревоге, страхе, зудящих дерматозах, для премедикации, устранения рвоты, икоты. |
| 2 | Трифтазин Triftasinum | 0,2%-1мл таб по 1, 5, 10мг | При психозах, неврозах, для устранения рвоты, тошноты. |
| 3 | Галоперидол (Сенорм) Haloperidolum | Амп 0,5%-1мл; таб 0,005г | При психозах, неврозах, тревоге, страхе, зудящих дерматозах, устранения рвоты, тошноты. |
| 4 | Дроперидол Droperidolum («Таламонал» «Thalamonal») | Амп 0,25%-2мл | При психозах, тревоге, страхе, инфаркте миокарда, зудящих дерматозах, для премедикации перед наркозом, устранения тошноты и рвоты. |
| 5 | Тизерцин (Левомепромазин) Tisercin, Levomepromazin | Амп 2,5%-2мл д/и, таб 25мг, 50мг | При психозах, невралгии, тревоге, страхе, зудящих дерматозах. |
| 6 | Азалептин Azaleptinum | Таб 25мг; гранулы | При шизофрении, психопатиях, бессоннице. |
| 7 | Амисульприд (Солиан) Amisulpride, Solian | Амп 5%-1мл, таб 0,05г | При шизофрении. |

| Транквилизаторы | | | |
|------------------------|---|---|--|
| 1 | Диазепам (Сибазон, Реланиум, Седуксен, Брюзепам) Diazepam, Sibazonum, Relanium, Seduxen | Амп 0,5%- 2мл, таб 0,005г | При неврозах, психопатиях, шизофрении, депрессии, судорогах, эпилепсии, зудящих дерматозах, для премедикации. |
| 2 | Феназепам Phenazepamum | Амп 1%-1мл и 0,3%-1мл, таб 0,001 и 0,0005г | Неврозы, психопатии, шизофрении, при тревоге, страхе, эпилепсии, судорогах, параличах, для премедикации, зудящих дерматозах. |
| 3 | Хлозепид (Элениум) Chlozepidum, (Elenium) | Таб в обол. 0,005г, драже 0,005г | Истерики, неврастении, тревога, страх, в анестезиологии. |
| 4 | Атаракс (Гидроксизин) Atarax, (Hydroxyzine) | Амп 5%-2мл таб. 0,01г, сироп 100мл | При неврозах, психопатиях, шизофрении, тревоге, страхе, эпилепсии, судорогах, параличах, для премедикации, зудящих дерматозах. |
| Седативные | | | |
| 1 | Натрия бромид Natrii bromidum | Пор для приготовления 3% раствора, таб по 0,5г. | При неврастении, истерии, бессоннице, гипертонии, эпилепсии. |
| 2 | Калия бромид Kalii bromidum | Порошок, таб 0,5г. | При неврастении, истерии, бессоннице, гипертонии, эпилепсии. |
| 3 | Бромкамфора Bromcamphora | Порошок; табл 0,1-0,25г | Неврастении, неврозах сердца. |
| 4 | Корвалол (Валокордин) Corvalolum, Valocordinum | Раствор для приёма внутрь во фл 25мл | Седативное, спазмолитическое, антиаритмическое. Valocordinum Состав: этиловый эфир а-бромизовалериановой к-ты около 2% + фенобарбитал 1,82% + около 3% едкого натра + масло мяты перечной 0,14% + спирт этил 96% и воды дистиллированной до 100. |
| 5 | Валериана Valeriana | Растение, настойка 25мл, экстракт 0,02 | Успокаивающее, спазмолитическое. Вх в состав препарата Персен, капли камфорно-валериановые, сбор успокоительный. |
| 6 | Пустырник Leonurum | Настойка 25мл трава, в | Успокаивающее, спазмолитическое, |

| | | | |
|----------------------------|--|--|---|
| | | комплексе табл | гипотензивное. |
| 7 | «Ново-пассит» «Novo- Passit» | Таб, сироп 100мл | Успокаивающее, спазмолитическое. «Novo- Passit» Состав: гвайфенезин, экстр. Боярышника экстракты хмеля, зверобоя, Melissa, пассифлоры, бузины, валерианы зверобоя, Melissa, пассифлоры, бузины, валерианы |
| 8 | Пион Paeonia | Трава 50,0г, настойка 25мл | Успокаивающее, спазмолитическое. |
| 9 | Пассифлора Passiflora | Трава 50г в пачках | Успокаивающее, спазмолитическое. |
| Препараты Лития | | | |
| 1 | Лития карбонат Lithii carbonas | Таб 0,3 и 0,5г. | При маниакальных состояниях различного генеза. |
| Антидепрессанты | | | |
| 1 | Амитриптилин Amitriptylinum | Амп 1%-2мл таб 25мг; драже 75мг; капс 75мг | Депрессии, тревожно-депрессивные состояния. |
| 2 | Ниаламид Nialamidum | Таб 25мг; драже 0,025 | Тревожно-депрессивные состояния, при депрессии. |
| 3 | Дулоксетин (Симбалта) Duloxetine, Symbalta | Капс | При депрессии. |
| 4 | Зверобоя экстракт (Extractum Hyperici) | Экстракт 25мл | При лёгкой депрессии |
| 5 | Сиднофен Sydnophenum | Таб 5мг | Тревожно-депрессивные состояния. |
| Психостимуляторы | | | |
| 1 | Сиднокарб Sydnocarbum | Таб по 5мг, 10мг, 25мг | При заторможенности, вялости, алкогольной депрессии, задержке умственного развития. |
| 2 | Кофеин бензоат натрия Coffeinum- natrii benzoas | | Смотри аналептики |
| Ноотропные средства | | | |
| 1 | Пирацетам (Ноотропил Стамин) Piracetamum | Амп 20%-5мл таб 0,8г, капс 0,4г, сироп, 4,8%р-р | При сосудистой патологии головного мозга, слабоумии. |

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|
| 2 | Энцефабол (Пиридитол) Encerphabol, Pyriditolum | Таб, драже, сироп 100мл | Неглубокие депрессии, неврозы, энцефалопатии, нарушения мозгового кровообращения, церебральный атеросклероз. |
| 3 | Аминалон Aminalonum | Таб по 0,25 | При сосудистой патологии головного мозга, слабоумии. |
| 4 | Натрия оксибутират Natrii oxybutyras | 20%-10мл д/и, сироп 100мл | При неврозах, повреждениях ЦНС, бессоннице, для наркоза, гипоксии сетчатки глаз. |
| Вещества, влияющие на функции органов дыхания | | | |
| Стимуляторы дыхания | | | |
| 1 | Вещества, оказывающие на дыхательный центр прямое действие: Аналептики | Ампулы | Применение: смотри Аналептики: Кофеин, Кордиамин, БемеGRID, Карбоген, Этимизол, Камфора |
| 2 | Вещества, оказывающие влияние на дыхательный центр, рефлекторного действия: Н-холиномиметики : Цититон, Лобелин | Ампулы | Применение: смотри Н - холиномиметики |
| Противокашлевые средства | | | |
| 1 | Кодеин Codeinum | Порошок; таб. 0,015г | Для успокоения кашля (туберкулёз лёгких, силикоз). ЛС центрального действия. |
| 2 | Этилморфин (Дионин) Aethylmorphini hydrochloridum, (Dioninum) | Таб. 0,01 и 0,015г | Для успокоения кашля (туберкулёз лёгких, силикоз). ЛС центрального действия. |
| 3 | Либексин Libexin | Таб. 0,1г | Катары верхних дыхательных путей. |
| 4 | Бугамирата цитрат (Стоптуссин синекод) Stoptussin | Фл 10мл, таб. 0,005г | Противокашлевое, отхаркивающее. |
| 5 | Глауцина гидрохлорид Glaucini hydrochloridum | Таб. 0,05 и драже 0,01; 0,04г | Противокашлевое при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей. |
| 6 | Бронхолитин (Глауцин +Эфедрин) Broncholytin | Сироп 100мл | Противокашлевое и бронхорасширяющее: астмоидные состояния. |

| | | | |
|-------------------------------|--|---|--|
| 7 | Тусупрек (Окселадин) Tussiprex, Oxeladin | 0,2%-100мл сироп, таб по 10, 20 мг | Противокашлевое при ОРЗ, ОРВИ, бронхитах. |
| Отхаркивающие средства | | | |
| 1 | Амброксол (Амбробене, Амбrolан, Лазолван, Халиксол, Фервекс от кашля) Ambroxol, Ambrobene, Lasolvan, Halixol | Таб. 0,03, капсулы, сироп, капли, Амп 0,75% -2мл; свечи 0,015г | Муколитическое, отхаркивающее, слабое противокашлевое, при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей. |
| 2 | Бромгексин (Солвин,Бронхо- солан) Bromhexinum, Solvin | Таб. 8мг, си- роп, драже 4мг, мик- стура 100мл, эликсир 0,2%-100мл | Муколитическое, отхаркивающее, слабое противокашлевое при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей. |
| 3 | Ацетилцистеин (АЦЦ, АЦЦ Лонг) Acetylcysteinum, АСС | Таб., гранулы 20%р-р для ингаляций, 5%-10% р-р для инъекций | Отхаркивающее, при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей. |
| 4 | Трава термопсиса (Мышатник) Herba Thermopsisidis | Настой 1:300, экстракт сухой 0,05г, таб 0,01г | Отхаркивающее. В больших дозах как рвотное лекарственное средство. |
| 5 | Трипсин Trypsinum (Химотрипсин) | Пор во фл. и амп 5, 10мг | Для разжижения и облегчения удаления вязких секретов, при ожогах ЛС прямого действия |
| 6 | Калия йодид Kalii iodidum | Пор, таб 0,0001г | При воспалительных заболеваниях лёгких и верхних дыхательных путей. |
| 7 | Натрия гидрокар- бонат Natrii hydrocarbonas | Порошок, табл 0,3г, 0,5г. | Отхаркивающее, ЛС прямого действия. |
| 8 | Мукалтин Mucaltinum | Таб. 0,05г | Отхаркивающее при респираторных инфекциях. |
| 9 | Пертуссин Pertussinum | Сироп 100мл | Отхаркивающее, противокашлевое. |
| 10 | Растения с отхаркивающим действием | Трава, настой, сироп | Отхаркивающее при респираторных заболеваниях. |
| | | Алтея корень Radices Althaeae, | |

| | |
|--|--|
| | Солодка корни Radices Glycyrrhizae Девясил корневище с корнями Rhizoma cum radicebus Inulae, Мать-Мачеха Folia Farfarae, Чабреца трава Herba Thymi serpylli, Анис плоды Fructus Anisi vulgaris, Душицы трава Herba Origanii vulgaris, Багульника болотного побеги Cormus Ledi palustris |
|--|--|

Бронхолитические вещества

| | | | | |
|---|--|----------------------|---|--|
| 1 | Сальбутамол Salbutamololum (Вентолин, Саламол, Алопрол Бронховалеас, Сальбутол, Эквент, Асталин) | β-адреномиметик | Аэрозоль д/ингаляций, амп 0,1%-5мл, таб 0,002; 0,004; 0,006; сироп 0,04%-100мл | Бронхорасширяющее при астматическом статусе. |
| 2 | Изадрин Isadrinum (Новодрин Эуспиран Изупрел) | β-адреномиметик | 0,5% и 1% р-р 25 и 100мл для ингаляций, таб сублингв. 0,005г | При бронхоспазмах, для бронхографии. |
| 3 | Астмопент (Орципреналин Orciprenalini sulfas Алупент, Алутек, Астор) | β-адреномиметик | Аэрозоль 20мл, амп 0,05%-1мл, таб 0,02г | Бронхиальная астма. |
| 4 | Беротек Berotec (Фенотерол Fenoterol, Арутерол Партусистен) | β-адреномиметик | Аэрозоль 10;15;20мл-0,1и 0,2мг/доза по 100 и 200доз; д/ингаляций 0,1%-20; 40; 100мл | Бронхиальная астма. |
| 5 | Адреналина гидрохлорид и гидротартрат (Эпинефрин) Adrenalini hydrochloridum et hydrotartras | α, и β-адреномиметик | Ампулы 0,1%-1мл 0,18%-1мл | При анафилактическом шоке, бронхиальной астме, аллергических реакциях, передозировке инсулина. |
| 6 | Эфедрина гидрохлорид Ephedrini hydrochloridum (Ephedrosan, Ephalone, Neo-Fedrin) | Симпатометик | Порошок, таб 0,002г; 0,003; 0,01; 0,025г; Амп 5%-1мл | Для повышения А/Д, при ринитах местно, ингаляции при бронхиальной астме. |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| 7 | Атропина сульфат Atropini sulfas | М-хо- лино- блока- тор | Амп 0,05% -1мл, 0,1% -1мл, 1% гл капли, таб 0,005г. | При бронхоспас- тических состояни- ях, синусовой брадикардии. В анестезиологии перед наркозом и во время операции для предупреждения bronхо- и ларинго- спазма, ограничения секреции слюнных и бронх.желез. |
| 8 | Платифиллина гидротартрат Platyphyllini hydrotartras | М- холино блока- тор | Амп 0,2%-1мл, таб 0,005г, свечи 0,01г. | При спазмах гладких мышц органов брюшной полости, бронхов, кровеносных сосу- дов, брадиаритмиях. |
| 9 | Эуфиллин Euphyllinum (аминофиллин, диафиллин) | Мио- троп- ный спазмо литик | Порошок; таб. по 0,15; амп. 2,4%-5мл и 10мл; 24%-1мл | При бронхиальной астме, сердечной астме, bronхоспазмах и для улучшения мозгового кровообращения. |

Средства, применяемые при отёке лёгких

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | Спирт этиловый | Раздражаю- щие | 30-96% | Как пеногаситель, кислород пропускают через спирт. |
| 2 | Антифомсилан | Пеногаситель | Балло- ны | Как пеногаситель ингаляционно |
| 3 | Маннит Mannit | Осмотиче- ский диуретик | 15% фл 200мл; 400мл | При отёке мозга, лёгких. |
| 4 | Мочевина Urea pro injectionibus | Осмотиче- ский диуретик | Фл по 30,0; 60,0г | При отёке мозга, лёгких. В\в готовят Ex tempore |
| 5 | Фуросемид Furosemidum (Лазикс Lasix) | Сальуретик | Таб 0,04г; амп 1%-2мл | При отёке мозга, лёгких, отравлениях, артериальной гипертензии. |
| 6 | Пентамин Pentaminum | Ганглио- блокатор | Амп 5%-1мл | Для леч А/Г, при спазмах периферических сосудов. |
| 7 | Строфантин Ка Strophantinum К | Сердечный гликозид | Амп 0,025% | При острой сердечной недостаточности. |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------|---|
| | | | и 0,05%- 1мл | |
| 8 | Коргликон Corglyconum | Сердечный гликозид | амп 0,06% - 1мл | При сердечной недостаточности II и III степени. |
| 9 | Преднизолон Prednisoloni hydrochloridum | Гормон коры надпочечни- ков | Амп 3%-1мл, | При шоке, астме, недостаточности функции коры надпочечников. |

Вещества, влияющие на сердечно-сосудистую систему

| 1 Сердечные гликозиды | | | | |
|-----------------------|---|---|--|--|
| 1 | Дигоксин Digoxinum | Препарат напер- стянки | Амп 0,025%-1мл; таб 0,00025г | При сердечной недостаточности. Противопоказано при коронарной недостаточности и нарушениях сердечной проводимости. |
| 2 | Дигитоксин Digitoxinum | Препарат напер- стянки | Таб 0,0001г; суппозитории 0,00015г | При сердечной недостаточности. Противопоказано при коронарной недостаточ- ности и нарушениях сердечной проводимости. |
| 3 | Строфантин Ка Strophanthimum К | Препарат стро- фанта | Амп 0,025% и 0,05%-1мл | При острой сердечной недостаточности. |
| 4 | Коргликон Corglyconum | Препарат горич- цвета весен- него | Амп 0,06% -1мл | При сердечной недостаточности II и III степени. |

2. Противоаритмические средства

| № | Название | Группа | Ф. выпуск. | Применение |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | Новокаинамид Novocainamidum | Мембрано- стабилиза- тор | Таб 0,25г амп 10%-5мл | Аритмии, экстрасистолии. |
| 2 | Лидокаин Lidocainum | Анестетик | Амп 1%, 2%, 10% - 2мл | Для местной анестезии и при аритмии. |
| 3 | Дифенин | Противосудо- рожное | Таб | Различные виды аритмий. |

| | | | | |
|--------|--|---|---|--|
| | «Dipheninum» | | | |
| 4 | Анаприлин Aproprilinum (Обзидан) | β -адрено- блокатор | Таб 0,01 и 0,04г; амп 0,25%- 1мл; 10мл | При ИБС, артериальной гипертензии, аритмиях. |
| 5 | Верапамил Verapamilum (Изоптин) | Блокатор кальциевых каналов | Таб 0,04; 0,08г.; амп 0,25%-2мл | Аритмии, ИБС, стенокардия, при гипертензии. |
| 6 | Амиодарон Amiodaronum (Кордарон) | Блокатор калиевых каналцев | Таб 0,2г.; амп 5%-3мл | Аритмии, ИБС, стенокардии. |
| 7 | Калия хлорид Kalii chloridum | Препарат д /коррекции ионного равновесия | Амп 4%- 10 мл ; таб 0,5 и 1,0г. | Гипокалиемии, аритмии, при передозировке сердечных гликозидов. |
| 8 | Аспаркам (Панангин содержит- Калия аспарагинат и Магния аспарагинат) | Препарат д /коррекции ионного равновесия | Таб №50 драже , амп 10мл | Аритмии, гипокалиемии связанные с примене- нием диуретиков. |
| 9 | Калия оротат Kalii orotas | Стимулятор метаболичес- ких процессов | Таб 0,1 и 0,5г | Заболевания печени с интоксикациями, аритмии. |
| 1 0 | Дигоксин Digoxinum | Препарат наперстянки | Амп 0,025%- 1мл; таб 2.5мг | При сердечной недостаточности. Противопоказано при коронарной недостаточности и нарушениях сердечной проводимости. |
| 1 1 | Атропина сульфат Atropini sulfas | М-холино- блокатор | 0,05% и 0,1% -1мл, таб 1мг | При аритмиях, как спазмолитик, бронхолитик. |
| 1 2 | Эфедрин Ephedrini hydrochloridum | Симпато- миметик | Пор, таб 0,02;3мг 0,01г; амп 5%-1мл | Для повышения А/Д, при ринитах, бронхиальной астме. |

3. Средства, применяемые при стенокардии (антиангинальные)

| № | Название | Группа | Форма выпуска | Применение |
|---|---------------|---------|---------------|------------------|
| 1 | Нитроглицерин | Нитраты | Таб 0,0005; | При стенокардии, |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| | Nitroglycerinum (Перлинганит, Сустак) | | 1%-5мл внутри(капли), аэрозоль, Амп 0,1%- 10 мл д/и | левожелудочковой недостаточности |
| 2 | Анаприлин Anaprilinum | β-адреноблокатор | Таб 0,01 и 0,04г; амп 0,25%-1мл; 10мл | При ИБС, артериальной гипертензии, аритмиях. |
| 3 | Корвитол Corvitolum (Метопролол, метокард, эгилок) | β-адреноблокатор | Таб 0,025; 0,05; 0,1г.; амп 0,1%-5мл | При стенокардии, для профилактики инфаркта миокар- да, артер. гипер- тензии, мигрени. |
| 4 | Амиодарон Amiodaronum (Кордарон) | Блокатор калиевых каналцев | Таб 0,2г.; амп 5%-3мл | При аритмиях, ИБС, стенокардии. |
| 5 | Дипиридамол Dipyridamolum (Курантил, Персантин) | Препарат, вл. на свёртываемость крови и агрегацию тромбоцитов | Таб 0,025; 0,05; 0,075 амп 0,5%-2мл | Стенокардии, для профилактики ишемических инсультов, для предупреждения тромбоэмболичес- ких осложнений. |
| 6 | Но-шпа Nospanum (Пле-спа, Дротаверин) | Миотропный спазмолитик | Таб 0,04 и 0,08г.; амп 2%-2мл | При спазмах гладкой мускулатуры ЖКТ, желчевыводящих, мочевыводящих |
| 7 | Папаверина гидрохлорид Papaverini hydrochloridum | Миотропный спазмолитик | Таб 0,01 и 0,04 Амп 2%-2мл; суппозитории 0,2г | путей, спастических заболеваниях матки, спазмах |
| 8 | Валидол Validolum | Стимулятор слизистых и кожи | Таб, 0,06г капсулы 0,06; Фл 5мл | периферических сосудов, гипертонии. |

4. Средства, применяемые при инфаркте миокарда

| № | Название | Группа | Форма выпуска | Применение |
|---|----------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Фентанил | Нарк.анальгетик | Смотри анальгетики | Профилактика болевого шока |
| 2 | Морфин | Нарк.анальгетик | Смотри анальгетики | Профилактика болевого шока |
| 3 | Промедол | Нарк.анальгетик | Смотри анальгетики | Профилактика болевого шока |

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------------|--|
| 4 | Лидокаин | Анестетик | Смотри периф.ЛС | Аритмии |
| 5 | Строфан - тин К | Серд.гликозид | Смотри выше | Сердечная недостаточность. |
| 6 | Коргли- кон | Серд.гликозид | Смотри выше | Сердечная недостаточность. |
| 7 | Гепарин | Антикоагулянт прямого действ. | Амп и фл 1,2;5; 10;20мл | Стенокардия, инфаркт миокарда, тромбозэм- болия, для ограничения тромбообразования. |
| 8 | Нерагинум Адренали- на гидро- хлорид | Альфа- и бета адреномиметик | по 5000ЕД/мл Смотри выше | |

5.Гипотензивные средства

| № | Название | Группа | Форма выпуска | Применение |
|---|---|--|---|---|
| 1 | Клофелин Clophelinum (Гемитон, Клонидин) | α- адреномиметик, центральный симпатолитик | Таб 75мкг 0,00015; Амп 0,01%- 1мл | Гипертензия, гипертонический криз. |
| 2 | Допегит Doregit (Метилдофа) Methyldopa | α- адреномиметик | Таб 0,25 и 0,5г.; амп и фл 5% -1мл | Гипертоническая болезнь. |
| 3 | Физиотенз (Моксонидин) Moxonidine | Стимулятор имидазолино- вых рецепторов (находится в прод.мозге в центре регуляции А/Д) | Таб 0,001г. | Гипертония, разные виды. |
| 4 | Резерпин (алкалоид раувольфии) Reserpinum | Симпатолитик | Таб 0,0001 и 0,00025г. | Ранние стадии гипертонической болезни. |
| 5 | «Адельфан» (содержит Резерпин и Гигидралазин) | Симпатолитик, спазмолитик | Таб. | Гипертензии. |
| 6 | «Кристепин» «Crustepin» (Неокристепин содерж. Резерпин + Дигидроэрго- Кристин+Клопа- мид) | Симпатолитик, Комбинирован- ный препарат | Драже | Различные формы артериальной гипертензии. |
| 7 | «Трирезид» | Симпатолитик, | Таб | Артериальная |

| | | | | |
|----|--|--|---|---|
| | «Trirezid» (Тринитон содерж. Резерпин +Дигидролазин + Гидрохлортиазид) | Комбинирован- ный препарат | | гипертензия. |
| 8 | Анаприлин Aparilinum | β - адреноблокатор | Таб 0,01 и 0,04г; амп 0,25%-1мл, 10мл | При ИБС, артериальной гипертензии, аритмиях. |
| 9 | Эналаприл Enalaprilum (Энам, Энап, Берлиприл, Эднит) | Ингибитор ангиотензин- превращающего фермента | Таб 0,0025; 0,005; 0,01г амп 0,125%- 1мл | При арт. гипер- тензии и хр. застойной серд. недостаточности. |
| 10 | Енап Н Енап НЛ «Энап Н» «Энап НЛ» | Ингибитор АПФ. Комбинирован- ный препарат | Таб содер. Эналаприл и Гидро- хлортиа- зид | Гипотензивное и мочегонное. |
| 11 | Каптоприл Captopril (Капотен Capoten) | Ингибитор ангиотензин- превращающего фермента | Таб 0,0125; 0,025; 0,05; 0,1г | При арт. гипер- тензии и хр.застойной серд. недостаточности. |
| 12 | «Капозид» « Caposid» Содерж. Капто- прил и Гидрохлортиазид | Ингибитор АПФ Комбинирован- ный препарат | Табл. | Гипотензивное и мочегонное. |
| 13 | Лизиноприл Lisinopril (Диротон) | Ингибитор ангиотензин- превращающего фермента | Таб 0,0025; 0,05; 0,01;0,02 | При артер. гипер- тензии и хр.застойной серд. недостаточности. |
| 14 | Престариум Prestarium (Периндоприл) | Ингибитор ангиотензин- превращающего фермента | Таб 0,002 и 0,004г. | При арт. гипер- тензии и хр.застойной серд. недостаточности. |
| 15 | Теветен Teveten (Эпросартан) | Блокатор рецепторов ангиотензина II | Таб 0,2; 0,3; 0,4; 0,6г. | Гипертензии различной этиологии. |
| 16 | Коринфар Corinfar (Нифедипин, Кордипин, Кордафен) | Блокатор кальциевых каналов | Таб, драже, капсулы 0,01; 0,02г. | При гипертонической болезни, стенокардии. |

| | | | | |
|----|---|--------------------------------------|---|---|
| 17 | Амлодипин Amlodipin (Амод, Калчек, Норваск, Нормо- дипин, Стамло) | Блокатор кальциевых каналов | Таб 0,0025г; 0,005г; 0,01г. | При гипертонической болезни, стенокардии. |
| 18 | Натрия нитропруссид Natrii nitroprussidum | Периферичес- кий вазодилататор | Флак. 0,025г, 0,05г. д/пригот инъекц. р-ра Ex tempore | При гипертоническом кризе. |
| 19 | Эуфиллин Euphyllinum (Аминофиллин, Диафиллин Aminophyllinum) | Миотропный спазмолитик | Пор.; таб 0,15г; Амп 2,4%-5мл; 10мл; 24%-1мл | При бронх.астме, сердечной астме, бронхоспазмах, для улучшения мозгового крово- обращения и снижения А/Д. |
| 20 | Магния сульфат Magnesii sulfas | Миотропный спазмолитик | Амп20%, 25% -5мл и 10мл | Гипотензивное, спазмолитическое, антиаритмическое. |
| 21 | Дибазол (Бендазол) Dibazolum «Papasolum» «Andipalum» | Миотропный спазмолитик | Таб 0,002;0,004 0,02г; амп 0,5%; 1%- 1, 2, 5мл | Артериальная гипертензия, спазмы сосудов внутренних органов. |
| 22 | Гипотиазид Nurothiazid (Дихлотиазид, Гидрохлортиазид) | Тиазидный сальуретик | Таб 0,025; 0,05; 0,1г. | При отёках различного происхождения. |
| 23 | Индап Indap (Индапамид, Арифон) | Диуретик | Таб 2,5мг и 1,25мг | Отёки различного происхождения. |
| 24 | Фуросемид Furosemidum (Лазикс) | Сальуретик | Таб 0,005; 0,02; 0,04г; амп 1%-1мл, 2мл , 5мл | При отёках различного происхождения. |
| 25 | Этакриновая к-та Acidum etacrynicum (Урегит) | Диуретик | Таб 0,05г | При отёках. |
| 26 | Верошпирон Verospiron | Калий сберегающий | Таб 0,025; 0,05г; 0,1г; | При отёках различного |

| | | | | |
|----|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|
| | (Спиронолактон, Альдактон) | диуретик, антагонист альдостерона | амп 0,1%-10мл | происхождения. |
| 27 | Диакарб Diacarbum (Ацетазоламид) | Диуретик-ингибитор карбоангидразы | Таб 0,25г | Отёки, при глаукоме, эпилепсии. |

Средства, улучшающие мозговое кровообращение

| № | Название | Группа | Форма выпуска | Применение |
|---|--|--|--|--|
| 1 | Пирацетам Pyracetamum | Ноотропы | 20%-5мл д/и, таб, капс 0,4, сироп, 4,8%р-р | При сосудистой патологии головного мозга, слабоумии. |
| 2 | Энцефабол Encefabolum (Пиридитол, Церебол, Энербол) | Ноотропы | Таб 0,05г драже0,1 сироп во фл по 200 мл | Неглубокие депрессии, неврозы, энцефалопатии, нарушения мозгового кровообращения, церебральный атеросклероз. |
| 3 | Аминалон Aminalonum | Ноотропы | Таб 0,25г | При сосудистой патологии головного мозга, слабоумии. |
| 4 | Циннаризин Cinnarizinum (Стугерон) | Блокатор кальциевых каналов | Таб и капс 0,025г | При нарушении мозгового кровообращения. |
| 5 | Нимодипин Nimodipinum (Нимотоп) | Блокатор кальциевых каналов | Таб 0,03г; фл 0,02%-50мл д/инфузий | Ишемии мозга. |
| 6 | Кавинтон Cavintonum (Винпоцетин) | Сосудорасширяющее | Таб 5мг; Ампл 0,5%-2мл | Нарушения мозгового кровообращения, заболевания глаз и слуха. |
| 7 | Инстенон (содерж Гексобендин+ Этамиван+ Эофиллин) «Instenonum» | Комбинир.препарат: (Сосудорасшир.+ аналептик+ спазмолитик) | Таблетки; ампл по 2мл | Ишемии, гипоксии, нарушения кровотока головного мозга. |
| 8 | Трентал Trentalum (Пентоксифиллин, Агапурин, Вазонит, Флекситал) | Периферический вазодилататор | Таб 0,1г: 0,2; 0,4г; 0,6г; ампл 2%-5мл | Нарушения периферического кровообращения. |
| 9 | Эуфиллин | Периферический | Таб 0,15; | Нарушения |

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| | Euphyllinum (Аминофиллин) | вазодилататор | 2,4%-5, 10мл для в/в и 24%-1мл для в/м | периферического и мозгового кровообращения, бронхоспазмы. |
| 10 | Ксантинола никотинат Xantinoli nicotinas | Периферический вазодилататор | Таб 0,15; 0,5г; амп 15%-2мл | Нарушения периферического кровообращения. |
| 11 | Актовегин Actoveginum (Солкосерил) | Биогенные препараты (стимуляторы) | Драже 0,2г; амп 4%-2мл 5мл; фл10%; 20%- 250мл | Нарушения периферического и мозгового кровообращения, трофические язвы, при язвах ЖКТ. |
| 12 | Церебролизин Cerebrolisinum | Аминокислоты | Амп в 1мл сод. 0,215г по 1мл; 5мл; 10мл | При ишемическом инсульте, энцефалопатиях, нарушениях мозгового кровообращения. |
| 13 | «Танакан» «Tanacan» (Билобил) | Препарат из растения Гинкго-билоба, венотонизирую- щее | Таб 0,04; фл 4%- 30мл д/приёма внутри | Энцефалопатии, нарушения мозгового и периферического кровообращения. |
| 14 | «Цераксон» «Ceraxon» | | Амп 5мл | Энцефалопатии, нарушения мозгового и периферического кровообращения. |
| 15 | Сермион Sermionum (Ницерголин Ницелин) | Альфа- адреноблокатор | Таб 10мг Амп сод. пор 0,004г. для инъ- екций | Энцефалопатии, нарушения мозгового и периферического кровообращения. |
| 16 | Оксибрал Oxybralum | Экстракт барвинка | Таб 0,03 амп 2мл | Энцефалопатии, мигрень. |
| 17 | Никотиновая к-та Acidum nicotinicum (Витамин РР, Витамин В ₃) | Витамины гр В | Таб0.025 0,05;0,1; 0,125г; 0,25г; 0,5г амп 1%-1мл; | При пеллагре, спаз- мах сосудов конеч- ностей, головного мозга, неврите, гиперхолестеринемии |
| 18 | Глиатилин | Витамины гр В | Пор; | При черепно- мозго- |

| | | | | |
|--|--------------------------------------|--|----------------------|--|
| | Cholini chloridum (Холина хлорид) | | Амп 20% - 10мл | вых травмах и др расстройствах ЦНС. |
|--|--------------------------------------|--|----------------------|--|

Антиоксиданты (ингибиторы свободнорадикальных процессов)

| № | Название | Форма выпуска | Применение |
|---|-----------------------------|----------------------------|--|
| 1 | Эмокси- пин Emoxipin | Амп 1%-3мл 3%-1мл | При ишемических и геморрагических нарушениях мозгового кровообращения, инфаркте миокарда, кожных заболеваниях. |
| 2 | Милдро- нат Mildronat | Амп 10%-5мл; капс 0,25г | Для ускорения реабилитации в послеоперационном периоде, при ИБС с серд.недостаточностью. |
| 3 | Мексидол Mexidol | Амп 5%-2мл, таб 0,125г | Нарушения мозгового кровообращения, энцефалопатии, атеросклерозе мозга, и др. |

Диуретические средства

| № | Название | Группа | Форма выпуска | Применение |
|---|--|---|---|--|
| 1 | Гипотиазид Nurothyazidum (Дихлотиазид) | Сальуретик | Таб 0,025; 0,05; 0,1г. | Как мочегонное при отёках. |
| 2 | Индап Indap (Индапамид, Арифон) | Диуретик | Таб 0,0025; 0,00125г | Как мочегонное при отёках. |
| 3 | Фуросемид Furosemidum (Лазикс) | Сальуретик | Таб 5мг; 0,02; 0,04г амп 1%-1мл, 2мл, 5мл | Как мочегонное при отёках. |
| 4 | Этакриновая к-та Acidum etacrynicum (Урегит) | Калий сберегающий диуретик | Таб 0,05г | При отёках различ- ного происхожде- ния. |
| 5 | Спиронолактон Spironolactonum (Верошпирон) | Калий сберегающий диуретик, антагонист альдостерона | Таб 0,025; 0,05; 0,1г; амп 0,1%-10мл | При отёках различного происхождения. |
| 6 | Диакarb Diacarbum | Диуретик- ингибитор карбоангидра- зы | Таб 0,25г | При отёках различного происхождения. |
| 7 | Маннит Mannitum | Осмотический диуретик | Р-р 15%- 200мл, 400мл д/инфузий | Для снижения внутричерепного давления, д/предупр отёка мозга, лёгких, отравлениях. |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| 8 | Мочевина Urea pro injectionibus 30% растворы готовят Ex tempore | Осмотический диуретик | Фл сод.по 30,0г; 60,0г; 90,0г пор (Р-р 30%) | Для снижения внутричерепного давления, д/предупр отёка мозга, лёгких, при отравлениях. |
| 9 | Можжевельник плоды, Толокнянка листья, Хвощ трава, Брусника лист, Берёзовые почки, Леспецефрала р-р | Растения, обладающие мочегонным действием | Настои, отвары | При отёках различного происхождения. |

Средства, влияющие на функции органов пищеварения.

1. ЛС, влияющие на аппетит.

1). Средства, повышающие аппетит

| № | Название | Группа | Форма выпуска | Применение |
|---|--|--------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | Полынь Absinthium | Горечи | Трава, настойка 25мл | Для возбуждения аппетита |
| 2 | Фитонциды: Лук Allium cepa; Перец красный Capsicum; Allium sativum Чеснок | Горечи | Настойки 50мл | Для аппетита |

2). Средства, понижающие аппетит (анорексигенные средства)

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| 1 | Фепранон Phepranolum (Дезопимон Desoripimolum) | Действует на центр насыщения в головном мозге. | Таб 0,025г приним. во время завтрака и обеда под строгим наблюден. врача | При ожирении, связанном с пере- еданием (противопоказано при гипертонии, стенокардии). |
| 2 | Орлистат Orlistat (Ксеникал Xenical) | Ингибитор всасывания жиров в ЖКТ | Капсулы 0,12г | При ожирении связанном с пере- еданием. |

2. Средства, влияющие на секрецию и функцию желудка.

1) Средства, применяемые при нарушении секреторной

функции желудка – а) недостаточной секреции желёз желудка

| № | Название | Группа | Форма выпуска | применение |
|---|--|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Пепсин Pepsinum Ацидин-пепсин Acidin-pepsinum | Фермент- ные препараты | Таб 0,04г | При гипо- и анацидных гастритах |
| 2 | Хлористоводородная кислота разведённая Acidum hydrochloricum | Кислоты | Разведённый р-р содержащий | При гипо- и анацидных гастритах |

| | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | dilutum | | 8,2% HCL | |
| 3 | Желудочный сок натуральный Succus gastricus naturalis | Ферментные препараты | Факоны 100, 150мл | При гипо- и анацидных гастритах |

б) Средства, применяемые при избыточной секреции желёз желудка

| № | Название | Группа | Форма выпуска | Применение |
|---|---|---|---|--|
| 1 | Атропина сульфат Atropini sulfas | М-холиноблокатор | Амп 0,1% и 0,05%-1мл р-р, 1% гл кап, таб 0,005г. | При язв.б-ни ЖКТ, пилороспазме, холецистите, желчнокам.б-ни, спазмах к-ка. |
| 2 | Платифиллина гидротартрат Platyphyllini hydrotartras | М-холиноблокатор | Амп 0,2%-1мл; таб 0,005г св. 0,01г. | При спазмах гладких мышц органов брюшной полости. |
| 3 | Фамотидин Phamotidin (Гастросидин, Квамател) | Блокатор H ₂ рецепторов | Таб 0,02; 0,04г; фл 0,02г лиофилизир. пор д/инъекц. | При язвенной болезни ж-ка и 12-перстной кишки и в комплексной терапии. |
| 4 | Ранитидин Ranitidinum (Гистак) | Блокатор H ₂ рецепторов | Таб 0,075; 0,15; 0,2г; 0,3г; амп 1%-5мл; 10%-2мл | При язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. |
| 5 | Циметидин Cimetidinum | Блокатор H ₂ рецепторов | Таб 0,2г; 0,4г; Сироп4%-100мл; амп 10%-2мл | При язв б-ни ж-ка и 12-п к-ки. |
| 6 | Омепразол Omeprazolium (Омез) | Ингибитор протонного насоса желудка (помпа) | Капс 0,01; 0,02г; лиофилиз. пор 0,04г. д/инфузии | При язв б-ни ж-ка и 12-п к-ки. |
| 7 | Контролок Controloc (Пантопрозол) | Ингибитор протонного насоса желудка (помпа) | Таб 0,02; 0,04г | При язв б-ни ж-ка и 12-п к-ки. |

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| 8 | Париег Pariet (Рабепразол) | Ингибитор протоново- го насоса жел(помпа) | Таб 0,01; 0,02г | При язв б-ни ж-ка и 12-п к-ки. |
| 9 | Натрия гидрокар- бонат Natrii hydrocarbonas (Сода двууглекислая) | Соли щелочных и щелочно- земельных металлов | Пор для приготов- ления 2-4% стериль- ного раствора | Для нейтрализации кислоты при гиперацидном гастрите. Ex tempore. |
| 10 | Алмагель Almagel Almagel A | Соли метал- лов. Препар- ат AL | Фл 170мл | При язв.б-ни ЖКТ и гиперацидном гастрите. |
| 11 | Маалокс «Maalox» | Соли метал- лов. Препарат алюминия | Таб; суспензия 250мл и 15мл | При язв.б-ни ЖКТ и гиперацидном гастрите. |
| 12 | «Гастал» «Gastal» | Соли метал- лов. Препарат алюминия | Таб | При язв.б-ни ЖКТ и гиперацидном гастрите. |
| 13 | Протаб «Protab» | Соли метал- лов. Препарат алюминия | Таб | При язв.б-ни ЖКТ и гиперацидном гастрите. |
| 14 | Висмута нитрат основной Bismuthi subnitras | Препарат висмута | Пор., в составе таблеток и присыпок | При язв. б-ни органов ЖКТ. Вх. в состав таб. «Викалин» и «Викаир», «Де-нол» |
| 15 | «Викалин» «Vicalinum» | Препарат висмута | Таб | При язв.б-ни ЖКТ и гиперацидном гастрите. |
| 16 | «Викаир» «Vicaïrum» | Препарат висмута | Таб | При язв.б-ни ЖКТ и гиперацидном гастрите. |
| 17 | Диосмектит (Смекта) Diosmektit | Соли металлов. Препарат алюминия | Порошок д/суспен- зий 3г | При диарее, воспалит. заболеваниях ЖКТ. |
| 18 | Де-Нол De-Nol | Препарат висмута | Таб 0,12г | При язв.б-ни ЖКТ и гиперацидном гастрите. |
| 19 | «Ренни» «Renni» | Препарат магния и кальция | Таб | При язв.б-ни ЖКТ и гиперацидном гастрите |

| | | | | |
|----|---|------------------------------|---|--|
| 20 | Метронидазол Metronidasolum (Трихопол, Клион, Метрогил, Флагил) | Противопротозойное средство | Таб 0,25; 0,5г; Таб ваг. и св. рект по 0,25г | При анаэробной инфекции органов дыхания, ЖКТ. |
| 21 | Кларитрамицин Clarithramycinum (Кладид, Клабакс) | Антибиотик группы макролидов | Таб 0,25; 0,5г; лиофил. пор 0,5г для приготовления инъекционного р-ра Ex tempore | В комплексной терапии язв б-ни желудка, 12-перстн. кишки, ассоциированной с <i>Helicobacter pylori</i> . |

2) Средства, влияющие на моторику желудка

| № | Название | Группа | Форма выпуска | Применение |
|---|---|-----------------------------------|---|--|
| 1 | Апоморфин Apomorphinum | Рвотное средство | Амп 1%-1мл | Рвотное при алкоголизме. |
| 2 | Термопсис Thermopsis | Раздражающее | Табл 0,01г | Рвотное, отхаркивающее. |
| 3 | Галоперидол Galoperidolum | Нейролептик | Таб 0,001; 0,005; 0,01г; амп 0,5%-1мл; фл 0,2%-10мл | При психозах, против рвоты, для нейролептанальгезии. |
| 4 | Метоклопрамид (Церукал, Церулин, Реглан Cercual) | Блокатор дофаминовых рецепторов | Таб 0,005г; 0,01г; амп 0,5%-2мл | Противорвотное. |
| 5 | Мотилиум Motilium (Домперидон) | Нейролептик | Таб 0,01г; суспензия 0,1%-200мл | При функциональных расстройствах желудочно-дуоденальной области. |
| 6 | Осетрон Osetron (Ондансеторон, Зофран) | Блокатор серотониновых рецепторов | Таб 0,004; 0,008г; амп 0,2%-2мл, 4мл | При рвоте, связанной с химио- и лучевой терапией злокачественных новообразований, в послеоперационном периоде. |
| 7 | Навобан Navoban (Тропиндол) | Блокатор серотониновых рецепторов | Амп 0,1%-2мл; 5мл; капс 0,005г | Для профилактики тошноты и рвоты при х/терапии опухолей и в послеоперационном периоде. |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------|---|--|
| 8 | Торекан Torecan (Тиэтилперазин) | Нейролеп- тик | Драже 0,0065г; суппозитории 0,0065г; амп 0,65%-1мл | Для предупреждения и прекращения тошноты и рвоты различного происхождения. |
| 9 | Драмина Dramina | Атигиста- минное | Таб 0,05г | При тошноте и рво- те, для профилактики воздушной и морской болезни. |

3. Средства, применяемые при нарушениях секции поджелудочной железы и печени

| № | Название | Группа | Форма выпуска | Применение |
|---|----------------------------|--|--|--|
| 1 | «Панзинорм» «Pansinorm» | Ферментные препараты | Таб | При недостаточной секреторной ф-ции ЖКТ и поджелудочной железы. |
| 2 | «Фестал» «Festal» | Ферментные препараты | Драже | При недостаточной секреторной ф-ции ЖКТ и поджелудочной железы. |
| 3 | «Энзистал» «Ensistal» | Ферментные препараты | Таб | При недостаточной секреторной ф-ции ЖКТ и поджелудочной железы. |
| 4 | Креон Creon | Ферментные препараты | Капс 10000 и 25000ЕД | При недостаточной секреторной ф-ции ЖКТ и поджелудочной железы. |
| 5 | «Вобэнзим» «Vobensim» | Ферментные препараты | Таблетки | Недостаточная секреция поджелудоч- ной железы. |
| 6 | Контрикал Contrical | Антифермент- ные препараты (Ингибитор протеолиза) | Пор 10000ЕД д/инъек- ций с р- рителем NaCl- 0,9% | При кровотечениях, связанных с гиперфибринолизом. |
| 7 | Гордокс Gordox | Антифермент- ные препараты (Ингибитор протеолиза) | Амп д/инъек- ций 10мл (100000 КИЕ) | Остр. и хр. панкреа- титы, при опасности травмирования поджелудочной железы. |
| 8 | «Аллохол» | Желчегонное | Таблетки | Хронические гепатиты, |

| | | | | |
|----|--|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| | «Allocholium» | Cholesecretica | | холангиты, холециститы. |
| 9 | «Холензим» «Cholenzimum» | Cholesecretica Желчегонное | Таблетки | Хронические гепатиты, холангиты, холециститы. |
| 10 | «Холосас» «Cholosasum» | Cholesecretica Желчегонное | Сироп 100мл; 250мл | Холециститы, гепатиты. |
| 11 | Оксафенамид Oxaphenamidium | Cholesecretica Желчегонное | Таб 0,25; 0,5; | Хронические холециститы, холангиты, желчнокаменная болезнь. |
| 12 | Атропин Atropini sulfas | М-холиноблокатор | 0,1%-1мл, таб 0,0005 | Смотри м-холиноблокаторы. |
| 13 | Платифиллин Platyphyllini hydrotartras | М-холиноблокатор Chologoga | Амп 0,2%-1мл; таб 0,005; | Смотри м-холиноблокаторы. |
| 14 | Магния сульфат Magnesii sulfas | Миотропный спазмолитик, препараты Mg | Порошок, амп 25%-5мл | Как желчегонное при холециститах, гепатитах. |
| 15 | «Гептрал» «Geptral» | Гепатопротектор | Таблетки | Гепатиты. |
| 16 | «Гепадиф» «Gepadif» | Гепатопротектор | Таблетки | Гепатиты. |
| 17 | «Гепабене» «Hepabene» | Гепатопротектор | Таблетки | Гепатиты. |
| 18 | «Эссенциале» | Ферменты | Таблетки | Диспепсии. |
| 19 | Овесол Ovesol | Фитопрепарат | Таблетки | Диспепсии. |

4. а) Средства, влияющие на моторику кишечника

| № | Название | Группа | Форма выпуска | Применение |
|---|-----------------------------------|--|--|--|
| 1 | Прозерин Proserinum | Холиномиметики Антихолинэстеразное средство | Амп 0,05%-1мл; таб 0,015г | При атонии кишечника, мочевого пузыря. |
| 2 | Магния сульфат Magnesii sulfas | Миотропный спазмолитик, препараты магния, слабительное | Порошок по 25,0-30,0г, амп 25%-5мл | Внутри как слабительное для быстрого очищения кишечника. |
| 3 | Касторовое масло Oleum Ricini | Слабительное | Масло фл. 25-50мл, капс 1,0г №15 | Хронические запоры. Противопоказано при беременности. |
| 4 | «Сенадексин» «Senadexin» | Слабительное | Таб | Хронические запоры. |

| | | | | |
|----|---|----------------------------|---|---|
| 5 | «Сенаде» «Senade» | Слабительное | Таб | Хронические запоры. |
| 6 | «Бисакодил» «Bisacodilum» | Слабительное | Таб | Хронические запоры. |
| 7 | Гутталак Guttalax | Слабительное | Р-р для приёма внутри 0,75%- 15мл | Хронические запоры. |
| 8 | Форлак Forlax | Слабительное | Пакеты 10,0г д/р-рения в 200мл воды | Хронические запоры. |
| 9 | Фортранс Fortrans | Слабительное | Пакеты 10,0г для растворения в 1л воды | Для опорожнения толстого к-ка при подготовке к диагностическим и оперативным вмешательствам. |
| 10 | Дюфалак Djufalac (Лактулоза) | Слабительное | Сироп 66,7% - 200мл; 500мл | При запорах. |
| 11 | Вазелиновое масло Oleum Vaselini | Размягчающее каловые массы | Фл 30мл | При запорах. |
| 12 | Свечи с глицерином Suppositorium cum Glycerino | Размягчающие каловые массы | Суппозитории 2,75г №10 | При запорах. |

в) Препараты, нормализующие микрофлору кишечника

| № | Название | Группа | Форма выпуска | Применение |
|---|--------------------------------------|---------------|---|--|
| 1 | Бифидумбактерин Bifidumbacterinum | Лактобактерии | Лиофилиз. пор во фл10млн КОЕ /1доза | Диарея, дисбактериоз. |
| 2 | «Линекс» « Linex» | Лактобактерии | Капс | Диарея, дисбактериоз. |
| 3 | Хилак – форте Chilac forte | Лактобактерии | Фл 30мл, 100мл | При расстрой - ствах пищеваре - ния, диарее, дисбактериозе. |
| 4 | Энтерожермина Enterogermina | Лактобактерии | Фл по 5мл | Диарея, дисбактериоз. |
| 5 | Лоперамид Loperamidum | Лактобактерии | Капс, Таб 0,002г | Острая и хроническая диарея. |

Средства, влияющие на систему крови (гемопэз, гемостаз и фибринолиз)

| № | Название | Группа | Форма выпуска | Применение |
|----|--|--|---|---|
| 1 | «Феррум-лек» «Ferrum-les» | ЛС влияющие на эритропэз, препараты Fe | Таб; амп 2мл для в/м и 5мл для в/в введ. | Железодефицитные анемии (гипохромная, нормобластическая анемия). |
| 2 | «Ферроплекс» «Ferroplex» | ЛС влияющие на эритропэз, препараты Fe | Драже | Железодефицитная анемия (гипохромная анемия). |
| 3 | «Активферрин» «Actiferrin» | ЛС, влияющие на эритропэз, препараты Fe | Капсулы и раствор | Железодефицитная анемия (гипохромная, нормобластическая анемия). |
| 4 | «Гемофер» «Haemofer» | ЛС влияющие на эритропэз, препараты Fe | Таб; р-р д/приёма внутрь 15,7%-10мл | Железодефицитная анемия (гипохромная, нормобластическая). |
| 5 | «Тардиферон» «Tardiferon» | ЛС влияющие на эритропэз, препараты Fe | Таблетки | Железодефицитная (гипохромная, нормобластическая) анемия. |
| 6 | Тотема «Totema» | ЛС, влияющие на эритропэз, препараты Fe | Амп 10мл д/приёма внутрь | Железодефицитная (нормобластическая) анемия. |
| 7 | «Феркайл» «Fercajl» | ЛС влияющие на эритропэз, препараты Fe | Амп 2мл для в/м и в/в введения | Железодефицитная анемия (гипохромная, нормобластическая) анемия). |
| 8 | «Космофер» «Cosmofer» | ЛС влияющие на эритропэз, препараты Fe | Амп 2мл в/в | Железодефицитная (гипохромная, нормобластическая) анемия. |
| 9 | Цианокобаламин (Витамин В ₁₂) Суанособаламинум | ЛС влияющие на эритропэз, препараты кобальта | Амп 0,05% и 0,02%-1мл | Пернициозная гиперхромная анемия, лучевая б-нь, заб. печени, полиневриты, радикулиты, кожные заболев. |
| 10 | Фолиевая к-та (витамин В ₉) Acidum folicum | ЛС влияющие на эритропэз, витамины | Таб 0,001г | Макроцитарная гиперхромная анемия. |

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| 11 | Ацетилсалициловая кислота Acidum acetylsalicylicum (Аспирин, ТромбоАСС, Тромбокард, терапин) | Тромборазжижающее, антиагрегантное, анальгетик, противовоспалительное | Таб 0,25г; 0,5г | Для профилактики тромбообразования. |
| 12 | Трентал Trental (Пентоксифиллин, Агапурин, Флекситал) | Тромборазжижающее, периферический вазодилатор | Таб 0,4; 0,6г; амп 2%-5мл | При нарушениях периферического кровообращения обусловленных облитерирующим атеросклерозом, сахарным диабетом, эндоартериитом. При энцефалопатии, ишемическом инсульте, трофических нарушениях, нарушении проходимости артерии сетчатки глаза, нарушениях слуха. |
| 13 | Дипиридамола Dipiridamolium (Курантил, Персантин) | Тромборазжижающее, антиагрегантное | Таб 0,025г; 0,05; 0,075; 0,1г; амп 0,5%-2мл | Для профилактики ишемических инсультов, нарушений мозгового кровообращения, для предупреждения тромбоэмболических осложнений. |
| 14 | Кардиомагнил Cardiomagnil | Тромборазжижающее, антиагрегантное | Таб 0,05; 0,075; 0,1г | Для профилактики ишемических инсультов, тромбообразований. |
| 15 | Викасол Vicasolum | Витамин К коагулянт | Таб 0,015г; амп 1%-1мл | При кровотечениях. |
| 16 | Кальция хлорид Calcii chloridum | Коагулянт, препараты кальция | Амп 10%-5мл фл 5% и 10%-200мл для приёма. Парентерально Кальция хлорид вводят только | При кровотечениях, как противоядие при отравлении солями магния, щавелевой к-той, антикоагулянтами, блокаторами кальциевых каналов, при кожных заб-х, при недостаточности ф-ции парасито- |

| | | | | |
|----|---|-----------------------|--|--|
| | | | внутривенно! | вид. ж-зы, при недостатке кальция, при аллергии |
| 17 | Тромбин Thrombinum | Коагулянт | Пор 0,001г д/местного применения, растворяют в 0,9% NaCl | Для остановки местных кровотечений при операциях на паренхиматозных органах. |
| 18 | Тахокомб Tachocomb | Гемостатик, адсорбент | Гемостатическая губка для местного применения | При кровотечениях во время и после операций. |
| 19 | Дицинон Dicinon (Этамзилат) | Агрегант | Таб 0,05г; 0,25г; амп 5%-1мл, 12,5%-2мл | При кровотечениях. |
| 20 | Адроксон Adroxon | Агрегант | Амп 0,025%-1мл | Для остановки паренхиматозных и капиллярных кровотечений. |
| 21 | Гепарин Heparinum | Антикоагулянт | Амп 2мл и 5мл (5000ЕД/мл); мазь в 1г содержит 100ЕД гепарина | Для профилактики и терапии тромбоэмболических заболеваний и их осложнений. Мазь при тромбозах, флебитах, тромбозе геморроидальных вен. |
| 22 | Фраксипарин Fraxiparin (Надропарин кальция) | Антикоагулянт | Одноразовый шприц для инъекций 0,3; 0,6; 0,8 и 1мл (9500МЕ/мл, 19000МЕ/мл) | Для профилактики и терапии тромбоэмболических заболеваний и их осложнений. |
| 23 | Клексан Clexan (Эноксапарин натрия) | Антикоагулянт | Шприц с 10% р-ром 0,2мл, 0,4мл, 0,6мл, 0,8мл, 1мл 10000МЕ/мл | Для профилактики и терапии тромбоэмболических заболеваний и их осложнений. |
| 24 | Стрептокиназа Streptocinasa (Стрептаза, Авелизин) | Фибринолитик | Лиофил. пор во фл 100000; 250000; 750000 МЕ; 1500000 МЕ Р-т в изотон. | Тромбоэмболии, тромбозы сосудов, острый инфаркт миокарда. |

| | | | | |
|----|---|--|---|---|
| | | | p-pe NaCl | |
| 25 | Фибринолизин Fibrinolysinum | Фибрино- литик | Лиофил пор д/инфуз.300- 350Ед и по 20000;30000; 40000Ед; Р- ряют в воде д/ин; гл плён- ки по 400Ед | Тромбоземболии, тромбозы сосудов, острый инфаркт миокарда. |
| 26 | Аминокапроно- вая кислота Acidum aminocapronicum | Антифибри нолитик | Фл 5%-100мл для инфузий | При кровотечениях для снижения фибринолитической активности крови. |
| 27 | Контрикал Contrical (Гордокс, Gordox Апротинин) | Антифибри нолитик, ингибитор протеолиза | Лиофилизир. пор 10000Ед для инъекций с р-рителем NaCl 0,9% | При кровотечениях, связанных с гиперфибринолизом. |
| 28 | Натрия нуклеинат Natrii nucleinas | Стимулятор процессов иммунитета | Фл. по 100гр, внутри 0,1-0,2г | Лейкопения, агранулоцитоз. |
| 29 | Метилурацил Methyluracilum (Метацил) | Производ- ное пиримидина | Пор таб 0,5г, свечи по 0,5г | Лёгкие формы лейкопении. |

Лекарственные средства, влияющие на гомеостаз.

Плазмозамещающие и дезинтоксикационные растворы

| № | Название | Группа | Форма выпуска | Применение |
|---|--|--|---------------------------------|--|
| 1 | Натрия хлорид изотонический р-р (0,9%) Solutio Natrii chloridi isotonica | Солевые р-ры, гемодинамичес- кое ЛС, соли щелочных металлов. | Фл 0,9%-200мл, 0,9%-400мл | При шоке, острых кровопотерях, нарушении микроциркуля- ции, интоксика- ции, для разведе- ния различных ЛС. |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| 2 | Натрия хлорид р-р гипертонический 2-10% Solutio Natrii chloridi | Солевые р-ры | Флаконы 2-10% по 50-200мл (10-20мл 10% р-р только в/в!) | Наружно для лечения гной- ных ран; ввиде клизм для дефе- кации, внутрь при отравлении солями серебра, внутривенно медленно при легочных, желудочноки- шечных кровотечениях и для усиления диуреза. |
| 3 | Глюкоза 5% изотонический раствор Solutio Glucosi isotonica | Гемодинамичес- кое, сахара | Фл 5%-200мл, 400мл | При шоке, острых кровопотерях, нару- шении микроцирку- ляции, интоксикац. |
| 4 | Глюкоза Glucosum | Сахара | Порошок, 10% р-р во фл, 40%,5%р- р в ампулах по5,10мл для инъекций | При гипоглике- мии, болезнях печени, интокси- кациях, токсико- инфекциях, при анемии с аскор- биновой к-той. |
| 5 | Полиглюкин Poli- glucin (Декстран - 60 000) | Гемодинамичес- кое ЛС, преп. на основе декстрана | Фл 6%- 200мл, 400мл | При шоке, для повышения А/Д |
| 6 | Реополиглюкин Reopoligluцин (Декстран с мол. массой 30 000- 40 000) | ЛС на основе декстрана. Дезинтоксика- ционное | Фл 10%- 200мл, 400мл | При шоке, ожо- гах, перитоните и для восстано- вления кровото- ка в капиллярах, уменьшения агре- гации формен- ных элементов. |
| 7 | Гемодез Haemodes (водно- солевой р-р низкомолеку- лярного поливинилпир- ролидона и ионов | Дезинтоксика- ционное | Фл 6%- 200мл, 400мл | При шоке, ожо- гах, перитоните и для восстано- вления кровото- ка в капиллярах, уменьшения агре- гации фор- |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| | Na, K, Ca, Mg, Cl) | | | менных элементов, увеличения диуреза, для детоксикации. |
| 8 | Натрия гидрокарбонат Natrii hydrocarbonas | Щёлочи | Пор для приготовления 4%-200мл, 400мл стерильных р-в | При ацидозах и кетоацидозах в/в Ex tempore. |
| 9 | Рингера раствор Solutio Ringeri | Солевые растворы | Фл 200мл, 400мл | При шоке, острых кровопотерях, нарушении микроциркуляции, интоксикации. |
| 10 | Ацесоль Acesol, Дисоль, Хлосоль, Трисоль | Солевые растворы, Гемодинамическое | Фл 200мл, 400мл | При обезвоживании, интоксикациях. |
| 11 | Калия хлорид Kalii chloridum | Препарат для коррекции ионного равновесия | Амп 4%-10мл; 20мл; 10%-р-р для пр. внутрь; таб 0,5 и 1,0г. | Гипокалиемии, аритмии, передозировке сердечных гликозидов, алкалозе |
| 12 | Аскорбиновая кислота (Витамин С) Acidum ascorbinicum | Водорастворимый витамин | Амп 5%, 10% -2мл; таблетки 0,05; 0,1г; драже 0,05г | Гипо- и авитаминозы, инфекционные заб-я, болезни печени, повышенная физическая и умственная нагрузка, интоксикационная б-нь, алкалоз и др. |

Препараты для парентерального питания

| № | Название | Форма выпуска | Применение |
|---|--------------------------------|-----------------|--|
| 1 | Инфезол Infesolum | Фл 250мл, 500мл | При белковой недостаточности, истощениях, интоксикациях, после операциях на ЖКТ. |
| 2 | Аминоплаз-маль Aminoplasmal | Фл 250мл, 500мл | При белковой недостаточности, истощениях, интоксикациях, после операций на ЖКТ. |
| 3 | Стабизол | Фл | При белковой недостаточности, |

| | | | |
|---|-----------------------|-------------------------------------|---|
| | Stabisol | 6%-250мл, 500мл | истощениях, интоксикациях, после операций на ЖКТ, для лечения гиповолемии и шока. |
| 4 | Рефортан Refortan | Фл 6% и 10%-250мл, 500мл | При белковой недостаточности, истощениях, интоксикациях, после операций на ЖКТ, для лечения гиповолемии и шока. |
| 5 | Альбумин Albuminum | Фл 5%,10%, 20%- от 10до 400мл | При тяжёлой гипоальбуминемии, истощениях и др. |

Средства, влияющие на миометрий

| № | Название | Группа | Форма выпуска | Применение |
|----|--|-------------------------------------|------------------------------|---|
| 1 | Окситоцин Oxytocinum | Гормон задней доли гипофиза | Амп 1мл(5ЕД) | Для вызывания родов при их задержке и для стимуляции родов, при родов.слабости. |
| 2 | Питуитрин Pituitrinum | Гормон зад-ней доли гип. | Амп 1мл(5ЕД) | Гипотонические кровотечения. |
| 3 | Касторовое масло Oleum Ricini | Слабительное | Флаконы по 25-50мл | Слабительное, для стимуляции родов (вызыв. рефлекторное сокращ. матки). |
| 4 | Эргометрина малеат Ergometrini maleas | Алкалоид спорыньи (гриб) | Таб 0,0002; амп 0,02%-1мл | При маточных кровотечениях в послеродовом периоде. |
| 5 | Сальбутамол Salbutamololum | β-адреноми-метик | Амп 0,1%-5мл; | Токолитическое. |
| 6 | Магния сульфат Magnesii sulfas | Миотропный спазмолитик, препаратыMg | Амп 25%-5мл | Токолитическое, слабительное. |
| 7 | Атропина сульфат Atropini sulfas | M- холино-блокатор | Амп 0,1%-1мл | Для раскрытия шейки матки. |
| 8 | Но-шпа Nospanum | Спазмолитик | Амп 2%-2мл | Для раскрытия шейки матки. |
| 9 | Промедол Promedolum | Наркотический анальг. | Амп 1%-1мл | Для обезболивания родов. |
| 10 | Эфир для наркоза Aether pro narcosi | Наркозные ЛС | Фл 100мл | Уменьшение родовой активности. |
| 11 | Прозерин Proserinum | Антихолин-эстеразноеЛС | Амп 0.05%-1мл | Для вызывания родовой активности. |

Препараты гормонов, их синтетических заменителей и антагонистов

| № | Название | Группа | Форма выпуска | Применение |
|---|--|--|---|---|
| 1 | Кортикотропин Corticotropinum (АКТГ, Адренкортикотропный гормон) | Гормон передней доли гипофиза | Лиофилизир. порошок для в/м инъекций по 10,20, 30,40ЕД | Как диагностическое средство для оценки резервов коры надпочечников. |
| 2 | Соматотропин Somatotropinum (Гормон роста) | Гормон передней доли гипофиза | Лиофилизир. пор для п/к и в/м инъекционных р-ров по 4, 8, 10, 12, 16, 24МЕ | Недостаточность гормона роста. |
| 3 | Соматостатин Somatostatinum (Стиламин) | Гормон гипоталамуса ингибитор соматотропина, пролактина, инсулина, глюкагона, серотонина, ферментов поджелудочной ж-зы | Лиофилизир. порошок для в/в инъекционных р-ров по 0,002; 0,0025; 0,003г с растворителем | При острых кровотечениях ЖКТ, при лечении свищей поджелудочной железы. |
| 4 | Сандостатин Sandostatatum (Октреотид) | Синтетический препарат антагонист соматотропина | Амп 0,005%; 0,01%; 0,05%-1мл и 0,1%-5мл для п/к и в/в инъекций | Для снижения концентрации гормона роста при акромегалии, лечении панкреатитов. |
| 5 | Соматулин Somatulin (Ланреотид) | Синтетический препарат антагонист соматотропина | Лиофилизир. порошок для инъекционных р-ров по 0,03 с расворителем | Для сниж. концентрации гормона роста при акромегалии, лечении панкреатитов. |
| 6 | Гонадотропин хорионический Gonadotropini chorionicum | Гормон передней доли гипофиза | Лиофилизир. порошок во фла для инъекционных в/м р-ров по 500, 1000, 1500ЕД, | При ослаблении функции половых ж-з у мужчин и женщин, обусловленном нарушением деятельности гипоталамуса и гипофиза, маточ- |

| | | | | |
|----|---|--------------------------------------|---|--|
| | | | 2000ЕД с р-рителем | ных кровотечениях, задержке полового развития, нарушении сперматогенеза. |
| 7 | Окситоцин Oxytocinum | Гормон задней доли гипофиза | Амп 1мл (5ЕД) | При слабой родовой деятельности при полном раскрытии шейки матки. |
| 8 | Питуитрин Pituitrinum (Окситоцин + Вазопрессин) | Смесь гормонов задней доли гипофиза | Амп 1мл (5ЕД) | При слабой родовой деятельности, при несахарном диабете. |
| 9 | Адиуретин Adiuretinum (Десмопрессин) (синтет. аналог Вазопрессина) | Гормон задней доли гипофиза | Таб 0,1г; амп 0,0004%-1мл д/и; р-р 0,1%-5мл для интраназального введен. | При несахарном диабете, ночном энурезе, гемофилии А, кровотечениях. |
| 10 | Тиреоидин Thyreoidinum | Препарат из щитовидных желёз | Таб 0,05; 0,1; 0,2г | Кретинизм, микседема. |
| 11 | Калия йодид (Йодомарин, Йод баланс) | Препараты йода | Таб 0,0001; 0,0002г | При эпидемическом зобе. |
| 12 | Паратиреоидин Parathyreoidinum | Препарат паразит. желёз | Амп 1мл(20ЕД) | При недостаточности ф-ции парашитовидных желёз. |
| 13 | Миакальцик (Кальцитонин) | Препараты кальцитонина | Назальный спрей 200МЕ | Остеопороз |
| 14 | Инсулин Insulinum (Хумулин, Хумалог, Восулин, Актрапид, Апидра, Лантус) | Гормон поджелудочной железы, аналоги | Фл 3мл;5мл; 10мл; 40ЕД/мл, 80ЕД/мл; 100ЕД /мл ; Суспензионные р-ры вводят в/м | Сахарный диабет I тип. |
| 15 | Сиофор Siofor (Метформин, Глюкофаж) | Противодиабетическое, бигуаниды | Таб 0,25; 0,5; 0,85г | Сахарный диабет II-типа, диабет с ожирением. |
| 16 | Глибенкламид Glibemclamid (Манинил) | Производное сульфанил-мочевины | Таб 0,005г | Сахарный диабет II-типа. |
| 17 | Диабетон Diabeton | Производные сульфанил- | Таб 0,04г; 0,08г | Сахарный диабет II-типа, диабет с |

| | | | | |
|----|---|--|--|---|
| | (Гликлазид) | мочевины | | ожирением. |
| 18 | Эстрадиол Oestradiolum | Эстрогенные препараты, фолликулярный гормон | Таб 0,002г; спрей интраназальный 4, 2мл; гель 0,06%-80,0г | При эстрогенной недостаточности в климактерическом периоде, после гинек. операций, при замедленном половом развитии у девочек, слабости родовой деятельности, для контрацепции, при раке предстательной железы. |
| 19 | Синэстрол Solutio Synoestrolis oleosa | Эстрогенные препараты нестероидного строения | Таб 0,001г; амп 0,1%-1мл масляный раствор | При эстрогенной недостаточности в климактерическом периоде, после гинек. операций, при замедленном половом развитии у девочек, слабости родовой деятельности, для контрацепции, при раке предстательной железы. |
| 20 | Прогестерон Solutio Progesteronis oleosa | Гестагенный препарат | Амп 0,5%,1%,2%-1мл –маслян. р-ры для в/м введения; гель 1%-80г | При аменорее, бесплодии, маточных кровотечениях, угрожающем выкидыше, мастопатии, для контрацепции. |
| 21 | Дюфастон Djufaston (Дидрогестерон) | Гестагенный препарат | Таб 0,01г №20 | При эндогенной прогестиновой недостаточности: эндометриозе, бесплодии, угрож. выкидыше, предменструальном синдроме, дисменорее, аменорее, маточных кровотечениях |
| 22 | Нон-овлон, Ригевидон, | Комбинированный | Драже №21 | Контрацептивное, при лечении |

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| | Логест Новинет Марвелон Регулон, Три-Регол Триквилар, Жанин, Евра, Non-ovlon | контрацептивный, эстроген-гестагенный препарат | | гинекологических заболеваний, климактерических синдромах. |
| 23 | Климонорм Climonorm (Фемастон) | Комбинированный препарат | Драже №21 | При климактерических расстройствах и нарушениях менструального цикла. |
| 24 | Диане-35 Diane-35 | Препарат содержит эстроген- и антиандрогенный препарат | Драже №21 | При гиперандрогенных проявлениях у женщин и в качестве контрацептивного ср-ва. |
| 25 | Тестостерона пропионат Solutio Testosteroni propionatis oleosa | Препарат мужских половых гормонов (андрогены) | Амп 1%-1мл, 5%- 1мл масляный раствор | При эндометриозе, миоме матки, остеопорозе, климактерических расстройствах, раке мол. ж-зы и яичников, маточных кровотечениях у пожилых, половом недоразвитии у мужчин. |
| 26 | Ретаболил Retabolilum | Анаболический стероид | Амп 5%-1мл | При нарушении белкового анаболизма, анемии, язв б-ни ЖКТ и др. |
| 27 | Дезоксикортикостерона ацетат Solutio Desoxycorticosteroni acetatis oleosa | Гормон коры надпочечников, минералокортикостероидный препарат | Амп 0,5%-1мл масляный р-р таб 0,005г | Болезнь Аддисона и временное ослабление функции коры надпочечников. |
| 28 | Гидрокортизон Suspensio Hydrocortisoni acetatis | Гормон коры надпочечников, глюкокортикостероидный препарат | Суспензия Амп 2,5%-2мл, 5мл ; мазь и крем 1%-15г; глазная мазь 0,5%-3,0г | При острой недостаточности надпочечников, острых аллергических реакциях, астме, шоке, инфаркте миокарда и др. |
| 29 | Преднизолон Prednisoloni | Глюкокортикостероид- | Таб 0,001; 0,005г; | При острой недостаточности надпо- |

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| | hydrochloridum | ный препарат | Мазь 0,5%-10г; амп 3%-1мл | чечников, острых аллергических реакциях, астме, шоке, инфаркте миокарда и др. |
| 30 | Дексаметазон Dexamethasonum | Глюкокорти- костероид- ный препарат | Таб 0,0005; 0,0015; 0,004г амп 0,4%-1мл; глазные капли 0,1%-5мл | Ревматоидный артрит, дерматозы, нефротический син- дром, аллергические заб., лимфогрануло- матоз, шок, отёк го- ловного мозга, б-нь Аддисона, экзема, язвенный колит. |
| 31 | Кеналог Cenalog (Триамциноло- на ацетонид, Полькортолон, Фторокорт Синафлан, Флуцинар, Лоринден) | Глюкокорти- костероид- ный препарат | Суспензия амп д/инъекц 1%, 4%-1мл; мазь 0,025% и 0,1%-10г; таб 0,004г | Ревматоидный артрит, дерматозы, нефротический синдром, аллерги- ческие заб., лимфогра- нуломатоз, шок, отёк головного моз- га, б-нь Аддисона, экзема, язв. колит. |
| 32 | Дипроспан Diprospranum (Бетаметазон, Белодерм, Целестодерм В Белосалик, Дипросалик, Тридерм) | Глюкокорти- костероид- ный препарат | Р-р и суспензия д/и в амп 0,5%-1мл; таб 0,0005г; мазь, крем, лосьон. | При экземе, дерма- титах, зуде, псори- азе, при недостаточ- ности надпочечни- ков, ревматоидном артрите, восп. заб-х суставов, аллерги- ческих заб-х, анемии. |

Витаминные препараты

| № | Название | Группа | Форма выпуска | Применение |
|---|---|---------------------------------|---|--|
| 1 | Тиамин бромид Thiamini bromidum (Вит В ₁) | Водораст- воримый витамин | Ампулы 3%-1мл, 6%-1мл; таб 0,0129г | Гипо- и авитаминозы, радикулит, невралгии, полиневриты, язв б-ни ЖКТ, спазмы пери- ферических сосудов. |
| 2 | Рибофлавин Riboflavinum (Витамин В ₂) | Водораст- воримый витамин | Пор, таб 0,005; 0,01г; гл капли 0,01%-10мл | Конъюнктивиты, поражения роговицы, лучевой б-ни, заболева- ниях кишечника. |
| 3 | Никотино- вая к-та Acidum | Водораст- воримый витамин | Амп 1%-1мл; таб 0,05г | При спазмах перифери- ческих сосудов, атеро- склерозе, язв б-ни ж-ка и |

| | | | | |
|----|---|---------------------------------|---|--|
| | nicotinicum (Витамин В ₃ Вит РР) | | | 12-п к-ки, язвах кожи и слизистых оболочек. |
| 4 | Пиридокси- на гидро- хлорид Pyridoxini hydrochlori- dum Вит В ₆ | Водораст- воримый витамин | Амп 1%-1мл, 5%-1мл; таб 0,005; 0,01г | При токсикозе бере- менных как противорвот- ное, при паркинсонизме, радикулитах, язв б-ни ж-ка и 12-п к-ки, кожных заболеваниях. |
| 5 | Цианокоба- ламин Суано cobalaminum Вит В ₁₂ | Водораст- воримый витамин | Амп 0,003%, 0,01%, 0,02%, 0,05%- 1мл; таб 0,00005г | При пернициозной анемии, благоприятно влияет на ф-ции печени и нервной системы. |
| 6 | Фолиевая кислота Аси- dum folicum (Вит В _с) | Водораст- воримый витамин | Пор.; таб 0,001г | При макроцитарной ане- мии, лейкопениях вызван ных лекарственными средствами и радиацией. |
| 7 | Кальция пан- гамат Calcii pangamas (Вит В ₁₅) | Водораст- воримый витамин | Таб в оболочках по 0,05г | При атеросклерозе, болезнях печени и кожи. |
| 8 | Аскорбино- вая кислота Acidum ascorbicum (Витамин С) | Водораст- воримый витамин | Амп 5%, 10%-2мл; таб 0,05; 0,1г; драже 0,05г | Гипо- и авитаминозах, инфекционных заб-х, болезнях печени, повышенной физической и умственной нагрузке, интоксикациях, лучевой б-ни, кровотечениях и др. |
| 9 | Витамин Р Препарат Рутин Rutinum | Водораст- воримый витамин | Таб 0,02г | Для снижения проницае- мости капилляров, аллер- гических заб-х, ревматиз- ме, лучевой б-ни, инток- сикациях салицилатами, мышьяком и др. |
| 10 | Ретинола ацетат/паль- митат (Витамин А) Solutio Reti- noli acetatis oleosa | Жирораст- воримый витамин | Драже, таб, капс, масляные р-ры д/внутрь 3300МЕ, 33000МЕ, 100000-250000 МЕ; ампулы 1мл/ 25000- 10000 МЕ в/м | При гипо- и авитами- нозах, различных инф-х и простудных заболеваниях, поражениях кожи и слизистых оболочек, болезнях ЖКТ. |
| 11 | Эргокальци- | Жирораст- | Капсулы, | При рахите, при недо- |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| | ферол (Вит Д ₂) Solutio Ergocalcife- roli oleosa | воримый витамин | драже 500- 1000МЕ, масл. и спирт. р-ры 25000-200000 МЕ внутрь. | статочности кальция в организме (тетания, осте- опороз, остеомалация остеодистрофия), кожных заболеваниях, переломах. |
| 12 | Токоферола ацетат (Витамин Е) Solutio Tocopheroli acetatis oleosa | Жирораст- воримый витамин | Драже 0,15; Капс 0,1-0,5; р- р в масле во фл 5%-30%-10- 50мл; амп р-р в масле для в/м 5%,30%-1мл | При нарушениях ф-ции половых желёз у мужчин и женщин, болезнях сердца и печени, угрозе выкидыша, мышечных дистрофиях. |
| 13 | Витамин К Препарат Викасол Vicasolum | Жирора- створимый витамин, коагулянт | Таб 0,015; ампулы 1%- 1мл | При кровотечениях, обусловленных пони- женным содержанием протромбина в крови. |

Разные витаминopodobные препараты

| № | Название | Группа | Форма выпуска | Применение |
|---|---|------------------|---|--|
| 1 | Глиатилин Gliatilinum (Холин хлорид) | Витамины гр В | Пор стер. 0,4г готовят 1% р-р с 0,9% NaCl Ex tempore | При заболеваниях печени, атеросклерозе, хроническом алкоголизме, черепномозговой травме, расстройствах ЦНС. |
| 2 | Тиоктацид Tiocacid (Тиогамма, Липоевая к-та) | Витамины гр В | Амп 0,5%-2мл | При заболеваниях печени, атеросклерозе, нарушениях зрительной функции. |

Поливитамины

| № | Название | Форма выпуска | Применение |
|---|---|------------------------|---------------------|
| 1 | «Биовиталь» «Biovital», «Витрум» «Vitrum», «Ундевит» «Undevit», «Пиковит» «Picovit», «Дуовит» «Duovit», «Ревит» «Revit», «Аевит» «Aevit», «Гексавит» «Hexavit» | Драже № 50 № 100 | Гиповитами- нозы |

Источники витаминов: А- печень трески, рыбий жир, красный

перец, щавель, морковь, помидоры, облепиха

В- хлеб отрубной, ржаной, гречка, овсянка, пшено

С- шиповник, чёрная смородина, облепиха, гранат, лимон
сладкий перец, цветная капуста, петрушка, рябина, клубника

Д –печень трески, рыбий жир, лосось, соя, молоко, яйца

Е- гречка, рожь, пшеница, кукуруза, соя, сыр, молоко, яйца

Противоаллергические средства

| № | Название | Группа | Форма | Применение |
|---|----------|--------|-------|------------|
|---|----------|--------|-------|------------|

| | | | выпуска | |
|----|---|----------------------|---|--|
| 1 | Димедрол Dimedrolum (Дифенгидра- мин) | Антигиста- минное | Амп 1%-1мл; таб 0,05г свечи 0,05г | Различные виды аллергий, как седативное, слабое противорвотное. |
| 2 | Пипольфен (Дипразин) Diprazinum | Антигиста- минное | Амп 2,5%-2мл; таб 0,025г; драже 0,05г | Различные виды аллергий. |
| 3 | Диазолин Diazolinum | Антигиста- минное | Таб 0,1г; драже 0,05г; 0,1г | Различные виды аллергий. |
| 4 | Супрастин Suprastinum (Хлоропирамин) | Антигиста- минное | Амп 2%-1мл; таб 0,025г | Различные виды аллергий. |
| 5 | Фенкарол Phencarolum | Антигиста- минное | Таб 0,025; 0,05г | Различные виды аллергий. |
| 6 | Тавегил Tavegil (Клемастин) | Антигиста- минное | Амп 0,1%- 1мл; таб 0,001г; сир. 0,013%-60мл | Различные виды аллергий. |
| 7 | Цетиризин Cetirizine (Зиртек, Zyrtec Зодак, Цетрин) | Антигиста- минное | Фл для внутр, применения 1%-10мл; таб 0,01г | Различные виды аллергий. |
| 8 | Гисталонг Histalong (Асте- мизол Astemizol) | Антигиста- минное | Таб 0,005г; 0,01; суспенз. 0,1%-100мл | Различные виды аллергий. |
| 9 | Лоратадин Loratadine (Кларитин) | Антигиста- минное | Таб 0,01г; сироп, сусп. 0,1%-100мл | Различные виды аллергий. |
| 10 | Кестин Kestin | Антигиста- минное | Таб 0,01г | Различные виды аллергий. |
| 11 | Фенистил Fenistil | Антигиста- минное | Таб 0,0025г; р-р 0,1% д/вн прим. Гель 0,1% -20гр | Различные виды аллергий. |
| 12 | Кетотифен Cetotifenum (За- диден Saditen) | Антигиста- минное | Таб 0,001г; сироп 100мл 0,0002г в 1мл | Различные виды аллергий. |
| 13 | Кромоглинат натрия Sodium Cromoglycate (Интал Intal) | Антигиста- минное | Аэрозоль 10мл-200доз; д/ингаляций в капс 0,02г спрей в нос. | Бронхиальная астма, астматический статус. |

| | | | | |
|----|---|-----------------------|----------------------------|---|
| 14 | Кризанол Crysanolum | Иммуноде- прессант | 5%-2мл в/м масл. суспен | Ревматоидный артрит. |
| 15 | Азатиоприн Azathyoprinum (Имуран Imuran) | Цитостатик | Таб 0,05г №50 | Трансплантация органов, ревматоидный артрит, псориаз, миастения. |

Противомикробные, противопаразитарные и противовирусные средства.

1. Антисептические и дезинфицирующие средства

| № | Название | Группа | Форма выпуска | Применение |
|---|--|------------|--|--|
| 1 | Хлорамин Б Chloraminum B | Галогены | Порошок, пакеты по 100г | Д/леч инфицированных ран 1, 5%, 2%р-ры; для дезинфекции рук 0,25%- 0,5% р-ры; д/дезинфекции предметов 0,25% -3%; при туберкулезе 5% р-р . |
| 2 | Хлоргексидин Chlorhexidinum (Гибитан) | Галогены | Концентрат 5% для пригото- вления рабочих р-ров | Д/ран 0,5% водный р-р; д/рук 0,5% спиртовой р-р; д/полоскания 0,02% водный р-р. |
| 3 | Йодинол Iodinolum | Галогены | Фл 100мл | Д/полоскания слизистых при тонзиллите, отите, рините, ожогах, гнойных хир. заб-х. |
| 4 | Йодовидон Iodovidon | Галогены | Фл 1%-100мл, 1000мл | Д/ран 0,5% и 1% раствор; д/полоскания слизистых 1ч л р-ра разводят в 200мл воды. |
| 5 | Перекись водорода концентриро- ванный р-р | Окислители | Концентрат 33% для приготовления рабочих р-ров | Для приготовления рабочих растворов. |
| 6 | Р-р перекиси вод. Sol Hydrogenii pero- xydi diluta | Окислители | Р-р 3% от 30мл до 500мл и больше, Фл 3%-50мл | Для обработки ран, для дезинфекции. |
| 7 | Гидроперит Hydroperitum | Окислители | Таб 0,5г; 0,75г; 1,5г | Для получения 1% р-ра 2таб по 1,5г р-ряют в 100мл воды. |
| 8 | Калия перманганат Kalii permanganas | Окислители | Порошок | Для полоскания 0,1%- 0,5%; 0,02%-0,1% ; для промывания желудка, спринцеваний. |
| 9 | Формальде- | Альдегиды, | Раствор для | Д/дезинфекции 0,5%-1% |

| | | | | |
|----|---|----------------------------------|--|--|
| | гид Formaldehydum | формалин | приготовления рабочих р-ров | растворы, для приготовления макропрепаратов. |
| 10 | Этиловый спирт Spiritus aethylicus | Спирты | От 96,6% до 20% спирта | 96%-90% д/дезинфекции инструментов и лечения ожоговых ран; 70% для обработки рук, кожи. |
| 11 | Фурацилин Furacillinum | Производное нитрофурана | Порошок, таб 0,02г (1 таб по 0,02 на 100мл горячей воды) | Для промывания ран и слизистых, для лечения дизентерии внутрь в таблетках. |
| 12 | Фенол (Карболовая к-та) Acidum carbolicum | Фенолы | Бесцветная маслянистая жидкость с раздражающим действием | 1%-3% р-ры д/дезинфекции предметов больничного обихода. |
| 13 | Ваготил Vagotilum | Фенолы | Флаконы по 50мл д/наружного применения | Эрозии шейки матки, воспаления влагалища, уретры, шейки матки. Для спринцевания влагалища 1ч л р-ра разв. в 1л воды. |
| 14 | Бриллиантовый зелёный Viride nitens | Красители | 1%-25мл 2% спиртовой р-р | Антисептическое наружно, для обработки поражённых участков кожи. |
| 15 | Метиленовый синий Methyleni coerulei | Красители | Пор для приготовления 1% р-ра Амп 1%-20мл | Для промывания и полоскания как антисептическое и для обработки кожи. |
| 16 | Ихтиол Ichthyolum | Дёгти, смолы | 5%-10% мазь по 25г, свечи 0,2г | Оказывает противовоспалительное, антисептическое действие. |
| 17 | Дёготь берёзовый Pix liquida Betule | Дёгти, смолы | Густая жидкость чёрного цвета. Вх в состав линимента Вишневого | Оказывает дезинфицирующее, инсектицидное, раздражающее действие. |
| 18 | Цитраль Citral | Альдегиды | Глазные капли | Антисептическое в виде капель. |
| 19 | Сера Sulfur | Препарат, содержащий серу | Порошок, Мазь 33%-20г | При заболеваниях кожи. |
| 20 | Педилин Pedilin | Препарат, содержащий тетраметрин | Шампунь, суспензия | При педикулёзе. |
| 21 | Бензилбензо- | Бензилбен- | Мазь 20%-20г | Для лечения чесотки, |

| | | | | |
|----|-------------------------------|-------------------|--|---|
| | ат Benzylbensoas | зоат | | педикулёза. |
| 22 | Протаргол Protargolum | Препараты серебра | 1%-3% р-ры для наружного использования | Антисептическое, вяжущее, противовоспалительное |
| 23 | Колларгол Collargolum | Препараты серебра | 1%-2% р-ры д/наружного использования | Для промывания гнойных ран, мочевого пузыря. |
| 24 | Серебра нитрат Argenti nitras | Препараты серебра | Пор для приг. 0,25%-2% р-ра, наружно. | Вяжущее, противовоспалительное, прижигающее. |

II. Химиотерапевтические средства

Антибиотики

Классификация: 1. β - лактамы

2. Аминогликозиды

3. Тетрациклины

4. Макролиды и азолиты

5. Группа левомецетина (хлорамфеникол)

6. Полимиксины

7. Антибиотики разных групп

| № | Название | Группа | Форма выпуска | Применение |
|---|--|-----------------------------------|---|---|
| 1 | Бензилпенициллина натриевая соль Benzylpenicillini Natrium | β -лактам Гр пенициллина | Порошок д/инъекционных р-ров во флак по 250 000 ЕД; 500 000; 1 000 000 ЕД; 5 000 000; 10 000 000ЕД Разводят Ex tempore с добавлением стерильной воды д/и, изотонического р-ра NaCl (0,9%) или 0,5% р-ра новокаина. | Активен в отношении грамположительных микроорганизмов (стафилококков, стрептококков, пневмококков, энтерококков, возбудителя дифтерии, анаэробов, актиномицетов, клостридий, палочки сибирской язвы), некоторых грамотрицательных кокков (гонококков, менингококков), а также спирохет и др. Вводят в/в, в/м, п/к |
| 2 | Бензилпенициллина калиевая соль Benzylpenicillini | β -лактам Гр пенициллина | Можно вводить в/м, п/к, местно | Как Б-пенициллин Na соль |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|---|
| | Kalium | | | |
| 3 | Бензилпенициллина новокаиновая соль Benzylpenicillini Novocainum | β -лактам Гр пенициллина | Препарат вводят только в/м | Как Б-пенициллин Na соль отличается медленным всасыванием и пролонгированным действием. |
| 4 | Бициллин-1 Бициллин-3 Бициллин-5 Bicillinum-1, 3, 5 | β -лактам Гр пенициллина | Препарат вводят только в/м Порошок д/инъекционных р-ров во фла по 300 000; 600 000; 1 200 000; 1 500 000ЕД | Для лечения сифилиса, ревматизма, рожи, скарлатины, послеоперационных осложнений, тонзиллита, гнойных инфекций. |
| 5 | Ампициллина тригидрат Ampicillini trihydras | β -лактам Гр пенициллина | Таб 0,25г; порошок д/инъекционных р-ров во фла по 0,25г; 0,5; 1,0; 2,0г; 5%-сироп, 2,5% суспенз. | Активен в отношении грамм-положительных микроорганизмов, чувствительных к бензилпенициллину и грамм-отрицательных микроорганизмов как салмонеллы, шигеллы, протей, кишечная палочка, палочка пневмонии. |
| 6 | Амоксициллин Amoxycillinum (Амосин) | β -лактам Гр пенициллина | Таб и капсулы 0,125; 0,25; 0,375; 0,5г; сироп и суспензия 0,5% и 0,25% | При инфекциях дых. путей, желче- и мочевыводящих путей, ЛОР-органов, ЖКТ, инфекциях кожи и мягких тканей, хирургических инфекциях и др. |
| 7 | Амоксиклав Amoxycilavum (Аугментин) Augmentin) | β -лактам Гр пенициллина | Таб 0,25; 0,5г суспензия д/внутр. прим.; порошок д/инъекционных р-ров во фла по 0,6 и 1,2г | Как амоксициллин |
| 8 | Цефазоли- | β - | Порошок | При инфекциях кожи, |

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| | на натриевая соль Cephazolin (Кефзол, Рефлин, Тотацеф, Цефамезин) | лактамы цефалоспорины I-поколения | д/инъекционных р-ров во фл по 0,125; 0,25; 0,5; 1,0г и 2,0г | мягких тканей, костей, суставов, сепсисе, эндокардите, инфицированных ожогах, для профилактики послеоперационных инфекций. |
| 9 | Цефалексин Cefalexinum (Споридекс) | β -лактам цефалоспорины I-поколения | Таб 0,5г и капс 0,25г, суспензия для внутреннего применения | При грамм ⁺ и грамм ⁻ инфекциях. |
| 10 | Цефуроксим Cefuroxim (Зинацеф) | β -лактам мы, цефалоспорины II-поколения | Порошок д/инъекционных р-ров во фл по 0,25; 0,75; 1,5г | Обладает широким спектром антимикробного действия. |
| 11 | Цефотаксим Cefotaxim (Клафоран) | β -лактам цефалоспорины III-поколения | Порошок д/инъекционных р-ров во фл по 0,25; 0,5; 1,0г и 2,0г | По химической природе близок к цефалоспорином 1 и 2 поколения, высоко активен в отношении грамм ⁻ отрицательных бактерий. Обладает широким спектром действия. |
| 12 | Цефтриаксон Ceftriaxon (Роцефин Roserphin, Цефаксон Cefaxon) | β -лактам цефалоспорины III-поколения | Пор д/инъекционных р-ров во фл по 0,25; 0,5; 1,0г и 2,0г Вводят в/м и в/в взрослым и детям старше 12лет | Как цефотаксим. Активен в отношении грамм ⁺ и грамм ⁻ бактерий, а также некоторых анаэробов (бактероидов, клостридий, пептококков). Обладает широким спектром действия. |
| 13 | Цефоперазон Cefoperazon (Медоцеф Medoccef) | β -лактам цефалоспорины III-поколения | Порошок д/инъекционных р-ров во фл по 0,5г; 1,0г и 2,0г Вводят в/м и в/в | Обладает широким спектром противомикробного действия. |
| 14 | Цефтазидим Ceftazidime (Фортум- | β -лактам цефалоспорины | Порошок д/инъекционных р-ров во фл по 0,5г; | Обладает широким спектром действия. Активен в отношении грамм ⁺ и грамм ⁻ бактерий, а также |

| | | | | |
|----|--|--------------------------------------|---|--|
| | пролонгированный Ceftriaxone (Ceftriaxone for injection) | III-поколения | 1,0г и 2,0г Вводят в/м и в/в | некоторых анаэробов (бактероидов, клостридий, пептококков). Высоко эффективен в отношении синегнойной палочки. Применяют при тяжёлых инфекциях вызванных синегнойной палочкой (пневмония, инфекции мочевыводящих путей, кожи, мягких тканей, костей, суставов), при инфекции брюшной полости, сепсисе, менингите |
| 15 | Цефепим Cefepim (Максипим Maxipime) | β-лактамы цефалоспорины IV-поколения | Порошок д/инъекционных р-ров во флак по 0,5г; 1,0г и 2,0г; вводят в/м и в/в | Обладает широким спектром действия. Активен в отношении грамм+ и грамм- бактерий, а также некоторых анаэробов (бактероидов, клостридий, пептококков). Высоко эффективен в отношении синегнойной палочки. Применяют при тяжёлых инфекциях вызванных синегнойной палочкой (пневмония, инфекции мочевыводящих путей, кожи, мягких тканей, костей, суставов), при инфекции брюшной полости, сепсисе, менингите |
| 16 | Имипенем Imipenem | β-лактамы карбопенымы | Порошок д/инъекционных р-ров во флак по 2,0г Вводят в/в | Обладает широким спектром действия. Активен в отношении грамм+ и грамм- бактерий. |
| 17 | Тиенам Tienam (Целостатин) | β-лактамы карбопенымы | Порошок д/инъекционных р-ров во флак по 0,5; 1,0г и 2,0г. Вводят в/м и в/в | Обладает широким спектром действия. Активен в отношении грамм+ и грамм- бактерий, анаэробов и аэробов. Применяют при тяжёлых инфекциях нижних дыхат. путей, пневмонии, инфекции мочевыводящих путей, кожи, мягких тканей, костей, суставов, инфекции брюшной полости, сепсисе, |

| | | | | |
|----|---|-----------------------------------|--|--|
| | | | | эндокардите, гонорее, гинекологических инфекциях. При менингите не рекомендуется. |
| 18 | Меропенем Meropenem (Меронем Meronem) | β- лактамы карбопене- мы | Порошок д/инъекцион- ных р-ров во фл по 0,5г; 1,0г Вводят в/м и в/в | Обладает широким спектром действия. Активен в отношении грамм+ и грамм- бактерий, анаэробов и аэробов. Применяют при тяжёлых инфекциях нижних дыхат. путей, пневмонии, инфекции мочевыводящих путей, кожи, мягких тканей, костей, суставов, инфекции брюшной полости, сепсисе, эндокардите, гонорее, гинекологических инфекциях, менингите. |
| 19 | Канамицин Kanamycin Канамици- на сульфат Kanamycini sulfas (Кантрекс, Токомицин) | Амино- гликозиды | Порошок д/инъекцион- ных р-ров во фл по 0,5; 1,0г (500 000 и 1 000 000ЕД) Обладает нефро- и ото- токсичнос- тью. Лечение проводят только под врачебным наблюдением | Применяют для лечения тяжёлых гнойно-септических заб-й (сепсиса, менингита, перитонита, эндокардита), инфекц. восп. заболеваний органов дыхания (пневмонии, эмпиемы плевры, абсцесса лёгких), инфекции почек и мочевыводящих путей, инфекционных ожогов, при туберкулёзе лёгких и иных органов при резистентности к противотуб. препаратам 1, 2 ряда и другим противотуб. средствам. |
| 20 | Стрепто- мицина сульфат Streptomycini sulfas | Амино- гликозиды | Порошок для инъекцион- ных р-ров во фл по 0,5; 1,0 г | Применяют в качестве основного противотуберкулёзного препарата для лечения впервые выявленного туберкулёза, при гнойно- воспалительных процессах различной локализации. |
| 21 | Гентамици- на сульфат Gentamycini | Амино- гликозиды | Флаконы по 0,08г, Ампулы 4%- | При различных заболеваниях с тяжёлой гнойной инфекцией |

| | | | | |
|----|---|-----------------------------------|--|--|
| | ni sulfas (Амгент, Генцин) | | 1мл, 2мл, мазь 0.1%- 10гр | |
| 22 | Тетрациклин Tetracyclinum (Имекс) | Тетрациклины | Таблетки по 0,05, 0,25г Капсулы по 100 000 ЕД, Мазь глазная 10,0 г | Пневмония, плевриты, септические эндокардиты, бактериальная и амёбная дизентерии, гнойный менингит, местно при инфекции глаз, ожогах, флегмонах, маститах. |
| 23 | Доксициклина гидрохлорид Doxycyclini hydrochloridum (Вибрамицин) | Тетрациклины | Капсулы по 0.05 и 0,1г. Таблетки 0,1г Флаконы 0,1г (100 000ЕД) | Применяют как тетрациклин |
| 24 | Эритромицин Erythromycinum (Илозон Эридерм) | Макролиды | Таблетки по 0,1г и 0,25г; мазь 1%-10,0г | Пневмония, сепсис, рожистое воспаление, мастит, перитонит, гнойный отит, остеомиелит и др. |
| 25 | Спирамицин Spigamycinum Ровамицин | Макролиды | Таблетки по 1 500 000 ЕД Флаконы по 1 500 000 ЕД | Ангины, скарлатины, отиты, синуситы, пневмонии, дифтерии, холециститы, простатиты и др. |
| 26 | Рокситромицин Roxytromycin (Рулид) | Макролиды | Таблетки по 0,05, 0,1г, 0,15, 0,3г. | Инфекции верхних дыхательных путей, отиты, синуситы, дифтерии. |
| 27 | Кларитрамицин Clarithramycin (Клацид Клабакс) | Макролиды | Таблетки по 0,5г Фл по 1,0г 1 000 000 ЕД | Инфекции органов дыхания и ЛОР (органов), хламидиоз, язвенная болезнь желудка. |
| 28 | Азитромицин Asitromycin (Азивок Сумамед) | Азолиды | Таблетки 0,125, 0,5г Капс. 0,25г Сироп, Флаконы 0,1г | Отиты, пневмонии, бронхиты, рожа, инфекции гениталия, ЗППП. |
| 29 | Линкомицин гидрохлорид Lincomycin | Линкомицины Lincomycini hydro- | Ампулы 30%-1мл, 2 мл; капс 0,25г | Септические состояния при острых и хронических остеомиелитах, пневмониях, гнойных инфекциях кожи и |

| | | | | |
|----|--|--------------------------|---|---|
| | (Линкоцин Медоглицин) | chloridum | Мазь 2%-15,0г | мягких тканей. |
| 30 | Левомецетин Laevomyces-tinum (Хлорамфеникол, Хлороцид) | Левомецетины | Таблетки в оболочках по 0,25, 0,5г; капсулы 0,1, 0,25г, 0,5г; глазн. капли 0,25%-10мл | Брюшной тиф, паратифы, салмонеллёз, бруцеллёз, коклюш, туляремия, менингит, риккетсиоз, хламидиоз. Местно для лечения инфекционных заболеваний глаз и кожи. |
| 31 | Ируксол Iruhol | Левомецетины | Мазь 30гр | Варикозные язвы, ожоги. |
| 32 | Синтомицин Synthomycinum | Левомецетины | Линимент 1%, 5%-25,0г 10%- 25,0г | Для лечения гнойных ран, гнойно-воспалительных заболеваний кожи и слизистых оболочек, трахомы. |
| 33 | Полимиксин М сульфат Полимиксин Н Polymyxinum M-, N-sulfas | Полимиксины | Таб. 0,5г (500 000 ЕД) Мазь, содержащая по 20 000ЕД полимиксина в 1гр-1000ЕД | При вялозаживающих ранах, инфицированных ожогах, некротических язвах, пролежнях, воспалительных заболеваниях глаз и уха, абсцессах. |
| 34 | Ванкомицин Vancomycinum (Эдицин) | Антибиотики разных групп | Флаконы по 0,5 и 1,0 г | Инфекционно-воспалительные заболевания тяжёлого течения, при неэффективности пенициллинов и цефалоспоринов: сепсис, остеомиелит, абсцесс лёгких. |
| 35 | Ристомидин сульфат Ristomycini sulfas | Антибиотики разных групп | Флаконы по 0,25 г (250 000 ЕД) | При тяжёлых септических заболеваниях: септический эндокардит, стафилококковый, стрептококковый и пневмококковый сепсис, гематогенный остеомиелит. |
| 36 | Фузидин натрия Fusidinum-natrii | Антибиотики разных групп | Таблетки по 0,125 и 0,25г | Для лечения септицемий, абсцессов, флегмон, фурункулёзов, пневмоний, отитов, инфицированных ожогов, ран. |

Синтетические противомикробные средства

| № | Название | Группа | Форма выпуска | Применение |
|---|----------|--------|---------------|------------|
|---|----------|--------|---------------|------------|

| | | | | |
|----|--|-----------------------------|--|--|
| 1 | Стрептоцид Streptocidum | Сульфанил-амиды | Порошок; таблетки 0,3г; 0,5г; Мазь 10% Линим. 5%-10,0г | Для лечения ангины, цистита, рожистого воспаления, пиелита, энтероколита, для профилактики и лечения раневой инфекции. |
| 2 | Сульфадимезин Sulfadimezinum (Суперсептил) | Сульфанил-амидные препараты | Порошок; таблетки 0,25 и 0,5г | При пневмококковых, стрептококковых, менингококковых инфекциях, сепсисе, гонорее. |
| 3 | Сульфацил-натрий Sulfacylum-natrii (Альбуцид) | Сульфанил-амиды | Порошок; 30%-5мл; глазные капли 20% и 30%-1,5г, 5 и 10мл | Пневмонии, гнойные трахеобронхиты, инфекции мочевых путей. Глазные инфекционные заболевания: блефариты, язвы. |
| 4 | Ко- тримаксозол Co-trimaxazol (Бисептол Biseptolum Ориприм) | Сульфаниламид + Триметоприм | Таб по 0,4г; 0,1г | Инфекции дыхательных, мочевыводящих путей, ЖКТ, хирургические инфекции, септицемии. |
| 5 | Сульгин Sulginum (Абигуанил) | Сульфанил-амиды | Порошок; таб по 0,5г | Кишечные инфекции, бактериальная дизентерия, колиты, энтероколиты, брюшной тиф. |
| 6 | Фталазол Phthalazolium | Сульфанил-амиды | Порошок; таб по 0,5г | Дизентерия, колиты, гастроэнтериты. |
| 7 | Салазопиридазин Salasopyridazinum | Сульфанил-амиды | Таб по 0,5г Свечи 0,5г Суспензии 5% | Неспецифический язвенный колит, при заболеваниях, протекающих с аутоиммунными нарушениями. |
| 8 | Нитроксолин Nitroxolinum (5-НОК, Нитрокс) | Производные 8-окси-хинолина | Таб в обол.0,05г | Инфекции мочеполовых путей: пиелонефриты, циститы, уретриты, простатиты. |
| 9 | Налидиксовая кислота Acilum nalidixicum (Неграм Невиграмон) | Хинолоны | Таб по 0,5г Капсулы по 0,5г | Инфекции почек и мочевыводящих путей, энтероколиты, холециститы. |
| 10 | Пипемиди- | Хинолоны | Капсулы | Острые и хронические |

| | | | | |
|----|--|-----------------------------------|--|---|
| | евая кислота (Палин) Palinum | | 0,1г, 0,2г; таб по 0,4г; свечи вл. по 0,2г | инфекции мочевыводящих путей. |
| 11 | Пефлоксацин Pefloxacin (Абактал. Пелокс) | Фторхино- лоны | Таб по 0,2г, 0,4 г Амп 8%-5мл | Инфекции дыхательных путей, уха, горла, носа, кожи, почек, мочево- водящих путей, остеомиелите и др. |
| 12 | Офлоксацин Ofloxacin (Глауфос, Таривид) | Фторхино- лоны | Таб по 0,2г | Как Пефлоксацин |
| 13 | Левовфлокса- цин Levofloxacin (Максаквин) | Фторхино- лоны | Таб по 0,4г Глазные капли 0,3%-5мл во фл. | Блефариты, конъюнк- тивиты, инфекции мочевыводящих и дыхательных путей, ЖКТ, остеомиелит, гонорея, хламидиоз и др. |
| 14 | Ципрофлокса- цин (Ципролет Ciprolet Сифлокс Siflox) | Фторхино- лоны | Таб по 0,25; 0,5 и 0,75г Ампулы 1%-10мл Фл 0,2%- 100 и 50мл | Как Перфлоксацин |
| 15 | Хиноксидин Chinoxudin | Производ- ное хинок- салина | Таб по 0,25г | Тяжёлые формы гнойно- воспалительных процессов (пиелиты, пиелоциститы, холе- циститы, абсцессы лёгких, эмпиемы плевры) |
| 16 | Диоксидин Dioxudin | Производ- ное хинок- салина | Амп 1%- 10мл для внутриполо- стного при- менения, 0,5%-10мл в/в Мазь 5%-25г | Как Хиноксидин |
| 17 | Фурацилин Furacillinum (Амифур Нитрофурал Нитрофура- зон) | Производ- ное нитро- фурана | Пор, мазь 1% Таб по 0,1г для внутр прим; 0,02г для наруж. | Для лечения и профилак- тики гнойно-воспали- тельных процессов: пролежни язвы, ожоги 2 и 3 степени, остеомиели- ты, гнойные отиты и т.п. |

| | | | | |
|----|--|-----------------------------------|---|--|
| | | | применения | |
| 18 | Фуразолидон Furazolido- num (Фуроксон) | Производ- ное нитро- фурана | Гранулы по 50г в стек- лянных фл. | Дизентерии, паратифы, пищевые токсикоин- фекции, трихомонадные кольпиты, лямблии. |
| 19 | Фурадонин Furadoninum (Нитрофуран тоин) | Производ- ное нитро- фурана | Таб по 0,05г; 0,1г и 0,03г | Пиелиты, пиелонефриты, циститы, уретриты. |
| 20 | Фурагин Furaginum (Фуразидин) | Производ- ное нитро- фурана | Порошок; таб по 0,05г | Как Фурадонин |

Противотуберкулёзные средства

| № | Название | Форма выпуска | Применение |
|---|---|---|--|
| 1 | Изониазид Isoniazidum (ГИНГ, Тубазид) | Пор. Таб по 0,1г; 0,2г и 0,3г Амп 10%-5мл | Для лечения всех форм активного туберкулёза различной локализации у взрослых и детей. |
| 2 | Фтивазид Phthivazidum (Ваницид) | Таб по 0,1; 0,3 и 0,5г | Как Изониазид |
| 3 | Этамбутол Ethambutol (Апобутал) | Таб по 0,1г; 0,2; 0,4 и 0,8г Капс 0,25г | В комбинации с другими противо- туберкулёзными средствами как Изониазид. |
| 4 | Стрептоми- цина сульфат Streptomycini sulfas | Флаконы по 0,25; 0,5 и 1,0г | Основное противотуберкулёзное средство для лечения впервые выявленного туберкулёза лёгких и других органов. |
| 5 | Рифампицин Rifampicinum (Бенемидин, Тубоцин) | Капс по 0,15; 0,3 и 0,45г Амп 0,15г | Туберкулёз лёгких и других органов, лепра, тяжёлые гнойно-септические процессы, острая гонорея, для профилактики бешенства. |
| 6 | Канамидина сульфат Kanamycini sulfas | Фл 500 000, 1 000 000ЕД Амп 5%-5м 10мл т 0,25г | Тяжёлые гнойно-септические заболевания, туберкулёз лёгких и других органов. |
| 7 | Ругазинами- дидум | Таб 0,5 г №100 | Противотуберкулёзный препарат основной группы. |
| 8 | Ethionamidum | Таб 0,25г №100 | Противотуберкулёзный резервный препарат. |
| 9 | Протионамид Protionamidum | Таб 0,25г №100 | Резервный противотуберкулёзный препарат. |

Противовирусные средства

| № | Название | Форма выпуска | Применение |
|----|--|--|---|
| 1 | Ацикловир Acyclovir (Ацивир, Виворакс, Улкарил, Зовиракс, Виролекс) | Флак по 0,25г Таб по 0,2г; 0,4г и 0,8г Мазь 3%-5,0г | Герпес с нарушениями иммунной системы, опоясывающий лишай, при пересадке органов и др. |
| 2 | Зидовудин Sidovudin (Ретровир Дотимидин) | Капс по 0,1 и 0,25г Сироп 1% -100мл Флак 2%-20мл | Системные вирусные инфекции: ВИЧ, СПИД. |
| 3 | Ремантадин Remantadinum (Полирем, Флумадин) | Таблетки 0,05г (50мг) | Раннее лечение и профилактика гриппа (А и В) в период эпидемий. |
| 4 | Интерферон лейкоцитарный Interferonum | Амп по 2мл | Для профилактики и лечения гриппа. |
| 5 | Реаферон Reaferonum | Флак по 1 000 000 МЕ; 3 000 000 МЕ и 5 млн МЕ | Вирусные и опухолевые заболевания (гепатит, волосатоклеточный лейкоз, саркома Капоши, кератит, увеит и т.д.). |
| 6 | Роферон А Roferonum A | Флак по 1; 3 и 5млн МЕ | Для профилактики и лечения гриппа |
| 7 | Оксолин Oxolinum | Пор для приг р-ов Мазь 0,25%; 0,5%; 1%, 2%; 3%-5,0г. | Вирусные заболевания глаз, кожи, вирусные риниты, профилактика гриппа. |
| 8 | Арбидол Arbidolum | Таблетки по 0,01г Капс 0,1; 0,05г | Лечение и профилактика гриппа (А и В) и ОРВИ осложнённые бронхитом, пневмонией. |
| 9 | Мидантан Midantan (Вирегит Амантадин) | Таблетки в обол 0,1г | Грипп типа А2 |
| 10 | Залцитабин Zalcitabin (Ховид) | Таб 0,000375г; 0,00075г | СПИД |
| 11 | Саквинавир Sanquinavir (Инвираз) | Капсулы 0,2г | СПИД |
| 12 | Диданозин Didanозine (Видекс) | Таб 0,025; 0,05; 0,1; 0,15г | СПИД |

Противопротозойные средства

| № | Название | Форма выпуска | Применение |
|---|---|---|---|
| 1 | Метронидазол Metronidazolium (Трихопол, | Флаконы 0.5%- 100мл Таб по 0,25; 0,4 и 0,5г | Острый и хронический трихомоноз, лямблиоз, амёбиаз, кожный лейшманиоз. Гнойные анаэробные |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | Метрид Метрогил) | Амп 0,5%-20мл | раневые инфекции, гастродуоденальные язвы. |
| 2 | Тинидазол Tinidazolium (Тиниба Фазижин) | Таб в обол. 0,15; 0,3 и 0,5г | Трихомоноз, лямблиоз, амёбная дизентерия. |
| 3 | Трихомонацид Trichomonacidum | Таб и супп. вагинальные по 0,05г | Урогенитальный трихомоноз у женщин и мужчин. |

Противогрибковые средства

| № | Название | Форма выпуска | Применение |
|---|---|--|--|
| 1 | Нистатин Nystatinum (Антикандин) | Таб 250 000ЕД Мазь 100 000ЕД в 1гр Свечи 250 000ЕД | Для профилактики и лечения заболеваний, вызванных дрожжеподобными грибами рода Candida:слизистых оболочек ЖКТ, кожи и внутренних органов. Для профилактики кандидозов при дли - тельном применении антибиотиков. |
| 2 | Леворина натриевая соль Laevorini Natrium | Флаконы 200 000ЕД | Кандидозы слизистых оболочек рта, носоглотки, кишечника, верхних дыхательных путей, вульвовагинитах, циститах и т.п. |
| 3 | Клотримазол Clotrimazolium (Антифунгол, Гине-лотримин Фунгинал) | Таб интра- вагиналь- ные 0,1г Крем 1%-20г | Микозы кожи и урогениталия. |
| 4 | Кетоконазол Ketokonazolium (Низорал Ороназол Фунгоцин) | Таблетки 0,2г | Поверхностные и системные микозы: кожи, волосистой части головы, сли- зистой полости рта, ЖКТ, мочеполовых и других органов. |
| 5 | Миконазол Miconazolium (Гино-Дактарин Дактодерм) | Таблетки 0,2 г Ампулы 1%-20мл, гель | Микозы ЖКТ, кожи и ногтей. |
| 6 | Флуконазол Fluconazolium (Дифлюкан) | Капс по 0,05;0,1;0,2г Сироп 0,5% Фл 0,2%-50мл | Криптококковый менингит, системный кандидоз, кандидоз слизистых оболочек, вагинальный кандидоз. |
| 7 | Итраконазол Itraconazolium | Капс по 0,1г | Различные грибковые инфекции, офтальмомикозы. |

| | | | |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | (Орунгал) | | |
| 8 | Тербинафин Terbinafin (Ламизил) | Таб 0,125 и 0,25г Крем 1%-15,0 | Грибковые и дрожжевые поражения кожи, ногтей, отрубевидный лишай. |
| 9 | Микосептин «Mycoseptinum» | Мазь 30,0г | Грибковые поражения кожи. |
| 10 | Мазь «Ундецин» | Мазь 25,0г | Грибковые поражения кожи. Unguentum «Undecinum». |

Противоглистные средства

| № | Название | Форма выпуска | Применение |
|---|---|---|--|
| 1 | Пиперазин Piperasini adipinas | Таб 0,2; 0,5г; р-р 5%-100мл д/приёма внутрь | При аскаридозе, энтеробиозе. |
| 2 | Вермокс Vermox (Мебендазол) | Таб 0,1г; суспензия д/приёма внутрь | При аскаридозе, энтеробиозе. |
| 3 | Декарис Decaris (Левамизол) | Таб 0,05; 0,15г | При гельминтозах. Как иммуномодулятор при ревматоидном артрите, хронических заб-х лёгких, почек, язв б-ни 12-перстной кишки и др. |
| 4 | Пирантел Pyrantel (Гельминтокс) | Таб 0,125; 0,25г; сусп. д/приёма внутри 10-15мл | При аскаридозе, энтеробиозе, анкилостомидозе, некаторозе, трихоцефалёзе. |
| 5 | Полыни цитварной цветки, Цитварное семя Semen Absinthii | Измельчённое сырьё по 50г | При аскаридозе |
| 6 | Пижма цветки Flores Tanaceti vulgaris | Измельчённое сырьё 75г | При аскаридозе, острицах и как желчегонное |
| 7 | Тыква семена Semina Cucurbitae | Измельчённое сырьё по 100г; 130г; 150г | При ленточных глистах |
| 8 | Празиквантел (Билтрицид) Biltricid | Таб 0,6г | При шистосомозах, опистор- хозе печени и лёгких, клонорхозе, фасциолёзе, парагонимозе, метагонимозе, тениозе и др. |

Рентгеноконтрастные средства

| № | Название | Форма выпуска | Применение |
|---|--|--------------------------|--|
| 1 | Триомбрат Triombrast (Уро- графин, Уротраст) | Амп 60%-10мл 76%-10мл | Для ангиографии, ангиокардиографии, флебографии. |
| 2 | Билигност | Ампулы 20мл | Для холецистографии. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Bilignost | | |
| 3 | Омнипак Omnipac (Йоексол) | Флаконы 10,15, 20, 40,50,100 и 200мл | Для урографии, ангиографии, флебографии, томографии, люмбографии. |
| 4 | Ультравист 240 Ultravist (Йопромид) | Флаконы 50мл | Для компьютерной томографии, ангиографии, флебографии, артрографии, миелографии. |
| 5 | Бария сульфат Barii sulfas | Порошок 100,0г | Для рентгеноскопии органов ЖКТ. |
| 6 | Магневист Magnevist | Флаконы 10 и 20мл | Для томографии внутривенно. |
| 7 | Пропилюдон Propiliodon (Дионозил) | Флаконы 15мл | Для бронхографии, сальпингографии, уретрографии. |

Лекарственные средства, применяемые при отравлениях ЛС

| № | Название | Группа | Форма выпуска |
|----|---|--|---|
| 1 | Натрия хлорид Sol. Natrii chloridi isotonica (0,9%) | Соли щелочных металлов | Флаконы 0,9% раствора по 200мл; 400мл |
| 2 | Глюкоза Sol. Glucosi 5 % | Сахара | Флаконы 5% раствора по 200мл, 400мл |
| 3 | Фуросемид (Лазикс) Solutio Furosemidi | Мочегонное | Ампулы 1%- 2мл |
| 4 | Коргликон Solutio Corglyconi | Сердечный гликозид | Ампулы 0,06%-1мл |
| 5 | Строфантин Ка Sol. Strophantini К | Сердечный гликозид | Ампулы 0,05%-1мл |
| 6 | Преднизолон Prednisoloni hydrochloridum | Глюкокортикоиды | Ампулы 3%-1мл |
| 7 | Уголь активированный Carbo activatus | Адсорбент, универсальный антидот | Порошок, назначают по 25-30гр в 0.5 стакана воды, запить ещё одним стаканом. |
| 8 | Унитиол Unithiolum | Антидот сердеч- ных гликозидов | Ампулы 5%-5мл |
| 9 | Калия перманганат Kalii permanganas | Окислитель | Порошок, 0,02% р-ры (1:5000), готовят перед применением |
| 10 | Маннит Sol. Manniti | Осмотический диуретик | Флаконы 15%-200мл |
| 11 | Магния сульфат | Антидот кальция | Ампулы 25%-10 мл |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | Sol. Magnesii sulfas | | |
| 12 | Атропина сульфат Atropini sulfas | Антагонист холин- номиметиков и АХЭ ЛС | Ампулы 0,1%-1мл |
| 13 | Адреналина гидро- хлорид Adrenalini hydrochloridum | Антагонист адре- ноблокаторов | Ампулы 0.1%-1мл |
| 14 | Кальция хлорид Calcii chloridum | Антидот магния | Ампулы 10%-10мл |
| 15 | Этимизол Aethymizolum | Аналептик | Ампулы 1,5%-3мл |
| 16 | Кордиамин Cordiaminum | Аналептик | Ампулы 2мл |
| 17 | Налорфина гидрохлорид Nalorphini hydrochloridum | Антагонист морфина | Ампулы 0,5%-1мл (для взрослых) и 0,05%-0,5мл (для новорожденных) |
| 18 | Налоксон Naloxonum | Антагонист опиатов | Ампулы 0,04%-1мл (0,4мг) |
| 19 | Мочевина для инъекций Urea pro injectionibus | Осмотический диуретик | Флаконы по 30,0; 60,0; 90,0 г стерильного порошка во флаконах, готовят Ex tempore. |
| 20 | Раствор нашатырного спирта Solutio Ammonii caustici | Раздражающие ЛС | Ампулы 10%-1мл Флаконы 10%-25мл |
| 21 | Эуфиллин (Аминофиллин) Euphyllinum | Бронхолитики | Ампулы 2.4%-10мл; 24%-1мл |
| 22 | Этиловый спирт Spiritus aethylicus | Раздражающие ЛС | Флаконы 70%-50мл, 90%-50мл |
| 23 | Натрия тиосульфат Natrii thiosulfas | Антидот | Ампулы 30%-10мл в/в; 10% по 20мл, 50мл внутрь. |
| 24 | Метиленовый синий Methylenum caeruleum | Антидот | Ампулы 1%-20мл с 5%-250мл раствором глюкозы, вводят в/в |
| 25 | Танин Tanninum | Антидот алкало- идов и солей тяжёлых металлов | Пор для приготовления 0,5% растворов, для промывания желудка. |
| 26 | Дефероксамин Deferoxaminum | Антидот железа | Ампулы содержащие 0,5г (500мг) лиофилизирован- ного порошка. |

Стандарты рецептов

- Rp.: Paracetamoli 0,2
D.t.d. № 10 in tabl.
S.: по 1 табл. 2 раза в день
- Rp.: Tabulettas «Allocholum» № 50
D. S.: внутрь по 1 табл. во время еды
- Rp.: Suppositorium cum Anaesthesino 0,3
D.t.d. № 10
S.: ректально по 1 свече при болях
- Rp.: Suppositoria vaginalia «Osarbonum» № 10
D.S.: по 1 свече во влагалище
- Rp.: Anaesthesini 0,3
Butyri Cacao 3,0
Miscе fiat suppositorium rectale
D.t.d. № 10
S.: по 1 свече в прямую кишку
- Rp.: Solutionis Natrii chloridi 0,9%-10ml
D.t.d. № 10 in amp.
S.: для разведения лекарств
- Rp.: Bicillini-3 600 000 ED
D.t.d. № 2
S.: содержимое флакона растворить в 5мл воды
для инъекций, вводить в/м
- Rp.: Aquae pro injectionibus 5ml
D.t.d. № 10 in amp.
S.: для разведения лекарств
- Rp.: Sol. Cotarnini chloridi 5%-50ml
Sterilisetur!
D.S. По 1 мл подкожно
- Rp.: Vicasoli 0,015
Sacchari 0,2
M.f.pulvis
D.t.d. № 10
S.: по 1 пор. 2 раза в сутки

Формат А6

| |
|----------------------------|
| Нысанның БҚСЖ бойынша коды |
| Код формы по ОКУД |
| КҰЖЖ бойынша ұйым коды |
| Код организации по ОКПО |

| | |
|---|---|
| Қазақстан Республикасы Денсаулықсақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан | Қазақстан Республикасы Денсаулықсақтау министрінің 20 ____ жылғы « ____ » _____ № _____ бұйрығымен бекітілген № 130/е нысанды медициналық құжаттама |
| Ұйымның атауы Наименование организации | Медицинская документация Форма № 130/у утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от « ____ » ____ 20 ____ года № _____ |

Ұйымның мөртабаны, шифры
Штамп, шифр организации
РЕЦЕПТ

| | |
|--|-------------------|
| БАЛАҒА АРНАЛҒАН | ЕРЕСЕККЕ АРНАЛҒАН |
| ДЛЯ РЕБЕНКА (сызып кою керек - подчеркнуть) | ДЛЯ ВЗРОСЛОГО |

20 ____ ж. « ____ » _____

(рецептің жазылған күні - дата выписки рецепта)

Сыраттың Т.А.Ә., жасы (Ф.И.О. больного, возраст) _____

Дәрігердің Т.А.Ә. (Ф.И.О. врача) _____

Рр. :

D.
S.

Рр.:

D.
S.

Рецептің жарамдылығы (рецепт действителен): 10 күн (дней), 1 ай (месяц),
арнайы тағайындау бойынша: «аптасайын» немесе «ай сайын»

(по специальному назначению: «еженедельно» или «ежемесячно»)

(сызып кою керек - нужно подчеркнуть)

ДӘРІГЕРДІҢ ҚОЛЫ МЕН ЖЕКЕ МӨРІ _____ м.о.
ПОДПИСЬ И ЛИЧНАЯ ПЕЧАТЬ ВРАЧА _____ м.п.

Для лекарственных средств, содержащих наркотические, психотропные вещества
и прекурсоры Таблиц II, III, IVСписка

Болімше басшысының қолы,

Ұйымның мөрі «Рецептер үшін» _____ м.о.

Подпись заведующего отделением,

Печать организации «Для рецептов» _____ м.п.

Келесі беттері 130/е н .Оборот ф. 130/у

Дәрігердің жадынамасы

1. Емдеу-профилактикалық ұйымының шифры баспаханалық тәсілмен басылады немесе мөртабан қойылады.
2. Рецепт латын тілінде, анық, айқын жазылады, шарикті қаламмен толтырылады, түзетуге тыйым салынады.
3. Бір бланкіге мыналар жазылуы мүмкін:
 - а) құрамында 8–оксихинолиннен шыққан заттар, улы заттар, гормондық стероидтер, клонидин, анаболикалық стероидтер бар бір дәрілік зат;
 - б) қалған дәрілік заттарға бір, екі дәрілік зат.
4. Ережеде қабылданған рецептуралық қысқартуларға ғана рұқсат етіледі.
5. Қатты, сусымалы заттар грамдарда (0,001; 0,02; 0,3; 1,0), сұйық заттар - миллилитрлерде, грамдар мен тамшыларда жазылады.
6. Қолдану тәсілі мемлекеттік немесе орыс тілдерінде жазылады.
7. «Шке», «Сыртқа», «Белгілі» деген жәнебасқа да жалпы нұсқаулармен шектеуге рұқсат етілмейді.
8. Рецептін толтырған кезде (ересекке арналған, балағаарналған) қажеттісінің астын сызу керек.
9. Қазақстан Республикасының денсаулықсақтау ұйымдарында жазылып берілген рецепттер республиканың бүкіл аумағында жарамды:
 - а) құрамында 8–оксихинолиннен шыққан заттар, улызаттар, гормондық стероидтер, клонидин, анаболикалық стероидтер бар дәрілік заттар жазылған күннен бастап - 10 күннің ішінде сатып алынса;
 - ә) тұрақты (ұзақ) емдеуді қажет ететін сырқаттарға дәрілік заттарды (а) тармағында көрсетілген жағдайларда берілетін дәрілік заттарды қоспағанда) жазып беру кезінде рецептілердің жарамдылық мерзімі үш айғадейін белгіленеді. Бұл ретте «Арнайы тағайындалған» деген жазудың және дәрілердің дәріханадан босату мерзімділіктерінің («аптасайынғы» немесе «ай сайынғы») қажеттісінің астылары сызылып, рецепті жазып берген дәрігердің қолымен және оның жеке мөрімен расталуы тиіс;
 - б) қалған рецептілер жазыпберген күннен бастап бір айғадейін жарамды.
10. Дәрігердің қолыны жеке мөрімен расталуы тиіс.

Памятка врачу

1. Шифр лечебно-профилактической организации печатается типографским способом или ставится штамп.
2. Рецепт выписывается на латинском языке, разборчиво, чётко, шариковой ручкой, исправления запрещаются.
3. На одном бланке может быть выписано:
 - а) одно лекарственное средство содержащее производные 8-оксихинолина, ядовитые вещества, гормональные стероиды, клонидин, анаболические стероиды; наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры таблиц III, IV Списка
 - б) одно, два лекарственных средства на остальные лекарственные средства.
4. Разрешаются только принятые Правилами рецептурные сокращения.
5. Твёрдые сыпучие вещества выписываются в граммах (0,001; 0,02; 0,3; 1,0), жидкие - в миллилитрах, граммах и каплях.
6. Способ применения указывается на государственном или русском языках.
7. Не допускается ограничиваться общими указаниями: «Внутреннее», «Наружное», «Известно» и другие.
8. При заполнении подчеркнуть предназначение рецепта (для взрослого, для ребёнка).
9. Рецепты, выписанные в организациях здравоохранения Республики Казахстан, действительны на территории всей республики:
 - а) рецепты на лекарственные средства, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры Таблиц Списка, действительны в течение 7 дней;
 - б) на получение лекарственных средств, содержащих производные 8-оксихинолина, ядовитые вещества, гормональные стероиды, клонидин, анаболические стероиды - в течение 10 дней со дня их выписывания;
 - в) больным, нуждающимся в постоянном (длительном) лечении (за исключением случаев, указанных в пункте а) - до трёх месяцев. При этом, подчеркиваются надписи «По специальному назначению» и по периодичности отпуска лекарств из аптеки («еженедельно» или «ежемесячно»), скрепляются подписью и личной печатью врача, выписавшего рецепт;
 - г) остальные рецепты - в течение одного месяца со дня их выписывания.
10. Подпись врача должна быть заверена его личной печатью.

Рецептурные сокращения

| Қыскартылу/ Сокращение | Толық жазылу /Полное написание | Қазақша аудармасы | Орысша аудармасы |
|---------------------------|---|--|---|
| aa | ana | тең мөлшерде, бірдей | по, поровну |
| ac. acid. | acidum | қышқыл | кислота |
| amp. | ampulla | ампула | ампула |
| aq. | aqua | су | вода |
| aq. purif. | Aqua purificata | тазартылған су | вода очищенная |
| but. | Butyrum | Май (қатты май) | масло (твёрдое) |
| comp., cps. | compositus, a, um | күрделі | сложный |
| D. D.: | Da, Detur. Dentur. | Бер,Берілсін, Босат | Выдай. Пусть будет выдано. Пусть будут выданы |
| D.S. D.S.: | Da. Signa. Detur. Signetur. | Бер, Белгіле, Берілсін, Белгіленсін; Беру,Белгілеу. | Выдай, обозначь. Пусть будет выдано, обозначено. Выдать, обозначить |
| D.t.d. | Da (Dentur) tales doses | Бер (Берілсін, Босат) осындай мөлшерде | Выдай (Пусть будут выданы) такие дозы |
| Dec. | Decoctum | қайнатпа | отвар |
| dil. | dilutus | сұйылтылған | разведённый |
| div. in p.aeq | Divide in partes aequales | тең бөліктерге бөл | раздели на равные части |
| Emuls. | emulsum | эмульсия | эмульсия |
| extr. | extractum | экстракт, сығынды | экстракт, вытяжка |
| f. | fiat (fiant) | жасалынсын, ол жасалынған болсын | пусть образуется (образуются) |
| gtt. | gutta, guttae | тамшы, тамшылар | капля, капли |
| Inf. | infusum | тұнба | настой |
| in amp. | in ampullis | ампула түрінде | в ампулах |
| in caps. gel. | in capsulis gelatinosis | желатин капсулада | в капсулах желатиновых |
| in tabl. | in tab(u)lettis | Таблетка түрінде | в таблетках |
| lin. | linimentum | Линимент (сұйық жағылма) | жидкая мазь |

| | | | |
|----------------------|-------------------|---|--|
| liq. | liquor | сұйықтық | жидкость |
| M. pil. | Massa pilularum | пилюля қоспасы | пилюльная масса |
| M. | Misce. Misceatur. | Араластыр. Араластырылсын. Араластыру | Смешай. Пусть будет смешано. Смешать |
| N. | numero | сан, дана | числом |
| ol. | oleum | май(сұйық) | масло (жидкое) |
| pil. | pilula | пилюля | пилюля |
| p.aeq. | partes aequales | тең бөліктер | равные части |
| pulv. | pulvis | ұнтақ | порошок |
| q.s. | quantum satis | қажетінше, керегінше | сколько потребуется, сколько надо |
| r., rad. | radix | тамыр | корень |
| Rp.: | Recipe: | Ал | Возьми |
| Rep. | Repete. Repetatur | Қайтала. Қайталансын | Повтори. Пусть будет повторено |
| rhiz. | rhizoma | тамыр | корневище |
| S. S.: | Signa. Signetur. | Белгіле. Белгіленсін | Обозначь. Пусть будет обозначено |
| sem. | semen | дән | семя |
| simpl. | simplex | қарапайым | простой |
| sir. | sirupus | шәрбәт | сироп |
| sol. | solutio | ерітінді | раствор |
| supp. | suppositorium | ембалауыз | свеча |
| tabl. | tab(u)letta | таблетка | таблетка |
| t-ra, tinct, tct. | tinctura | тұндырма | настойка |
| ung. | unguentum | жағылма | мазь |
| vit. | vitrum | күты | склянка |
| ppt, praec. | praecipitatus | тұндырылған | осаждённый |
| past. | Pasta | паста | паста |

Литература

1. В.В. Майский, В.К. Муратов. «Фармакология с рецептурой», Москва, Медицина, 1986г.
2. Н.И. Федюкович «Фармакология для медицинских училищ и колледжей», Ростов- на- Дону, Феникс, 2007г.
3. В.М. Виноградов, Е.Б. Катков, Е.А. Мухин. « Фармакология с рецептурой», Санкт-Петербург, Спецлит, 2006г.
4. «Лекарственные средства» М.Д. Машковский, Москва, 1984г. Издание девятое.
5. «Лекарственные средства» М.Д. Машковский, Москва, Новая волна, 2010г. Издание шестнадцатое.
6. Справочник «Vidal» 2004, 2007г., Лекарственные средства в Казахстане.
7. Справочник «Vidal» 1998г., Лекарственные средства в России.
8. Д.А. Харкевич., «Фармакология с рецептурой», Москва, МИА, 2005г.
9. М.И. Кравчук «Лекции по фармакологии», Шымкент «Аскаралы» 2009г
10. Н.В. Кузнецова «Клиническая фармакология», Москва, «ГЭОТАР-Медиа», 2012г.
11. Р.Н. Аляутдин, Н.Г. Преферанский, Н.Г. Преферанская « Фармакология», Москва. Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» 2010г
12. В.В. Майский, Р.Н. Аляутдин «Фармакология с рецептурой», Москва. Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» 2012г
13. Постановление Правительства РК от 30 декабря 2011 года №1693 «Об утверждении Правил оптовой и розничной реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники».
14. Постановление Правительства РК от 30 марта 2012года № 396 « Об утверждении Правил использования в медицинских целях наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в РК».
15. Постановление Правительства РК от 23 декабря 2011года № 1595 « Об утверждении Правил хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества».

